

مقایسه همدلی و شناسایی هیجان بین افراد سالم و افراد وابسته به مواد تحت درمان بعد از دو ماه، شش ماه و یک سال

مهناز عیاسی^۱، سوسن علیزاده فرد^۲، حدیث غفاری خلبی^۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات همدلی و درک هیجانی افراد وابسته به مواد محرک و مخدمر بعد از دو ماه، شش ماه و یک سال درمان و مقایسه آن با افراد سالم بود. **روش:** پژوهش حاضر حاضر علی-مقایسه‌ای و از نوع مطالعات طولی بود. جامعه آماری شامل همه افراد وابسته به مواد تحت درمان در کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر تهران در سال ۱۴۰۰ و افراد سالم از خانواده آنها بود. نمونه‌ای به حجم ۱۰۲ نفر (شامل ۳۴ نفر وابسته به مواد مخدمر، ۳۴ نفر وابسته به مواد محرک، و ۳۴ فرد سالم از خانواده‌های آنها) به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون همدلی و تکلیف بازشناسایی هیجان چهره بود. **یافته‌ها:** نتایج نشان داد که در طول زمان درمان، همدلی افراد وابسته به مواد افزایش یافت و پس از گذشت یک سال تفاوتی بین گروه وابسته به مواد مخدمر با گروه سالم وجود نداشت، در حالی که همدلی گروه وابسته به مواد محرک کماکان هنوز به سطح افراد سالم نرسیده بود. همچنین، مشخص شد که در طول زمان درمان، درک هیجان در هر دو گروه وابسته به مواد افزایش یافت، اما حتی پس از گذشت یک سال، بین دو گروه وابسته به مواد و افراد سالم در نمرات درک هیجان تفاوت معناداری وجود داشت. **نتیجه‌گیری:** این پژوهش نشان داد که از جمله آسیب‌های بلندمدت شناختی مصرف مواد، اثرات مربوط به توانایی‌های شناخت اجتماعی مانند همدلی و درک هیجان است. این امر اهمیت توجه به اثرات بلند مدت مصرف مواد و اقدامات درمانی و توانبخشی شناختی طولانی مدت را مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها: همدلی، شناسایی هیجان، وابستگی به مواد، شناخت اجتماعی، پژوهش طولی

۱. کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

۲. نویسنده مسئول: دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. پست الکترونیک: s.alizadeh@pnu.ac.ir

۳. دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مقدمه

اعتیاد^۱ یکی از بزرگترین مشکلات جوامع کنونی است که موجب بروز اثرات متفاوتی بر فرد و جامعه می‌گردد (سیسیلی، بردبri، گلدشتاین^۲، ۲۰۲۲). مواد مخدر یکی از چالش‌های بزرگ جامعه جهانی بوده که متأسفانه با رشد فزاینده‌ای رو به رو است، چنان‌چه در سال ۲۰۰۶ تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردانها در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال جهان معادل ۲۰۸ میلیون نفر بوده و این رقم در سال ۲۰۲۰ با افزایش ۳۲ درصدی، به ۲۷۵ میلیون نفر رسیده است (صرامی، ۱۴۰۰). در ایران نیز پژوهش‌های اخیر شیوع مصرف مواد را حدود ۱۱/۹ درصد گزارش کرده است (مرادیان‌آذر و همکاران، ۲۰۲۰؛ به نقل از نوجوان، سلیمانی و عیسی‌زادگان، ۱۴۰۱). براساس پنجمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی^۳، اختلال مصرف مواد^۴ برای توصیف طیف وسیعی از مشکلات خفیف تا حالت‌های شدیدی از الگوی مصرف اجباری معرفی شده است که به شکلی عود‌کننده و مزمن از مواد استفاده می‌شود (انجمن روانپزشکی آمریکا^۵، ۲۰۲۲). مصرف مواد همراه با عوارض ناخوشایندی است که موجب شده تا یک طبقه برای اختلالاتی در نظر گرفته شود که در اثر مصرف مواد ایجاد می‌شوند که یکی از آنها اختلالات عصبی-شناختی^۶ است (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۲۲).

فرایندهای شناختی یکی از حوزه‌های مهمی است که در اعتیاد دچار تغییر و آسیب می‌شوند و این تغییرات ناشی از اثرات مواد بر نواحی مختلف مغزی است (بل، برایسون، گریج، فیزدان و وکسلر^۷؛ بایز^۸ و همکاران، ۲۰۲۱). مطالعات تصویربرداری نشان داده‌اند که مناطق قشری پیشانی و پیش‌پیشانی^۹ از جمله مناطق اصلی است که در اثر مصرف مواد دچار انواع ناهنجاری‌های ساختاری و کارکردن می‌شود (کیم^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۵). آسیب قشر پیش‌پیشانی موجب بروز اختلال در کارکردهای شناخت اجتماعی^{۱۱}

۱۱۴

114

۱۴۰۱، ۱۷، No. ۶۸، Summer ۲۰۲۳

1. addiction
2. Ceceli, Bradberry & Goldstein
3. DSM-V-TR
4. substance use disorder
5. American Psychiatric Association
6. neurocognitive disorders

7. Bell, Bryson, Greig, Fiszdon & Wexler
8. Baez
9. Frontal & Prefrontal Cortex
10. Kim
11. social cognition

مغز می‌گردد (هومر^۱ و همکاران، ۲۰۰۸). شناخت اجتماعی برقراری تعاملات مناسب را برای انسان فراهم می‌آورد. از جمله مهمترین مولفه‌های شناخت اجتماعی میتوان به همدلی^۲ و درک هیجان^۳ دیگران اشاره نمود (فیسک و تیلور^۴، ۲۰۱۷؛ به نقل از علیزاده فرد، زارع و راضی، ۱۴۰۰).

همدلی را می‌توان به عنوان توانایی به اشتراک گذاشتن حالات عاطفی با دیگران و همچنین توانایی اتخاذ دیدگاه‌های عاطفی مشابه تعریف نمود (دی وال و پرستون، ۲۰۱۷^۵). این یک مفهوم چند بعدی است که در هدایت بسیاری از هنجارهای پیچیده اجتماعی مانند همکاری در جهت اهداف مشترک و پیوند اجتماعی نقش دارد، امری که برای شکل‌گیری و حفظ روابط ضروری است (دستی، نورمن، برنتسون و کاسیوپو^۶، ۲۰۱۲؛ دستی، ۲۰۱۵؛ آدریانسه، کاسکی، هوبر و لامه^۷، ۲۰۲۰). مطالعات همدلی اخیراً به شواهد بسیاری دست یافته که نشان می‌دهند فرآیندهای همدلی با انواع اختلالات روانپزشکی در راهنمای تشخیصی و آماری، از جمله اختلال مصرف مواد مرتبط است. با توجه به ماهیت اجتماعی اختلال مصرف مواد، جای تعجب نیست که کاهش فرآیندهای همدلانه به عنوان بخشی از پیامدهای شناختی آن محسوب شود (بایز و همکاران، ۲۰۲۱). تاکنون مطالعات محدودی

۱۱۵

۱۱۵

پژوهشنامه، سالهای ۱۷-۱۸، تابستان ۱۴۰۲
Vol. 17, No. 68, Summer 2023

به بررسی تغییرات همدلی در انواع مختلف مصرف مواد پرداخته‌اند، اما در تمامی آنها کاهش همدلی گزارش شده است (کاکس و ریچل^۸، ۲۰۲۳). برای مثال، راینسون، فوکاس و ویتکویویتز^۹ (۲۰۱۸) با مطالعه بر روی نمونه‌ای شامل ۱۷۲۶ نفر دریافتند که بین اعتماد، همدلی و حمایت اجتماعی در مردان رابطه معناداری وجود دارد. آنان کاهش همدلی در این افراد را در ارتباط مستقیم با شبکه حمایت اجتماعی یافته و آن را یک عامل مهم در پیش‌بینی موفقیت درمان معرفی نمودند. همچنین بایز و همکاران (۲۰۲۱) نیز دریافتند که نگرانی همدلانه در افراد معتاد کاهش می‌یابد؛ آنان نشان دادند که این امر با

1. Homer
2. empathy
3. emotion recognition
4. Fisk & Taylor
5. De Waal & Preston

6. Decety, Norman, Berntson & Cacioppo
7. Adriaense, Koski, Huber & Lamm
8. Cox & Reichel
9. Robinson, Fokas & Witkiewitz

ناهنجاری‌های آناتومیک در مغز همراه است که به نوبه خود با اختلال در تعاملات اجتماعی و کارکردهای اجتماعی دیگر همراه خواهد بود. اخیرا در یک مطالعه فراتحلیل نیز کاهش همدلی در اختلال مصرف مواد مورد تایید قرار گرفته و مشخص شده است که در گروه‌های بالینی و پیش‌بالینی اختلالات مصرف مواد، کاهش همدلی همراه با تغییرات رفتاری و نوروپیوژیکی دیده می‌شود (کاکس و ریچل، ۲۰۲۳). کاهش همدلی موجب می‌شود تا این افراد بدون توجه به درد و ناراحتی که اعمال‌شان برای دیگران مانند خانواده و دوستان‌شان ایجاد می‌کند، همچنان به استفاده از آن ادامه دهند (وینترز، براندون-فریدمن، یپس و هینکلی، ۲۰۱۲؛ کوئیدنو، ۲۰۱۷).

دیگر مولفه مهم شناخت اجتماعی، تغییر و درک هیجان چهره دیگران، یا بازشناسی هیجان است. بازشناسی هیجان به عنوان توانایی تمیز حالات عاطفی مختلف در چهره دیگران و درک معنای اجتماعی-بافتی آنها تعریف می‌شود (راپاپورت^۳ و همکاران، ۲۰۲۱). توانایی بازشناسی و درک هیجان یکی از مهارت‌های اولیه برای موفق بودن در موقعیت‌های اجتماعی و رشد همدلی است (لیو و فا^۴، ۲۰۲۱). بروز هیجان‌های چهره‌ای، دارای کارکرد ارتباطی بوده و اطلاعات خاصی را به بینده القاء می‌کند. از این رو هیجان‌ها یکی از منابع مهم اطلاعاتی در تعاملات اجتماعی، هم برای فرد تفسیر کننده هیجان و هم برای فرد نمایش‌دهنده هیجان محسوب می‌شوند (اونال-آیدین، بالیکچی، سونmez و آیدین^۵، ۲۰۲۰). بر همین اساس، توانایی تشخیص هیجان چهره در بسیاری از اختلالات روانپزشکی موضوع پژوهش و بررسی بوده است (یامادا، ایناگاوا، هیرابایاشی و سامی‌یوشی^۶، ۲۰۲۲). این امر درباره افراد مبتلا به اعتیاد نیز حائز اهمیت است، زیرا آنها در طول زمان مصرف با پیامدهای نامطلوبی روبرو می‌شوند که بخش مهمی از آنها مربوط به روابط عاطفی، هیجانی و تعامل سالم با دیگران است (آدریانسه و همکاران، ۲۰۲۰). پژوهش‌هایی که در زمینه نقش پردازش هیجان چهره در مصرف کنندگان مواد انجام

1. Winters, Brandon-Friedman, Yipes & Hinckley
2. Quednow
3. Rappaport
4. Liu & Fu

5. Ünal-Aydın, Balıkçı, Sönmez & Aydin
6. Yamada, Inagawa, Hirabayashi & Sumiyishi

گرفته گزارش می‌نمایند که در همه موارد، در ک هیجان چهره این افراد دچار اختلال شده است (بايراکچی^۱ و همکاران، ۲۰۱۴؛ اونال-آیدین و همکاران، ۲۰۲۰، کاکس و ریچل، ۲۰۲۳؛ نجاتی، شیری و نوری، ۱۳۹۱؛ قربانی، نجفی، نجاتی و محمدی‌فر، ۱۳۹۷). اخیرا در یک مطالعه مروری نیز اثر مصرف مواد بر در ک هیجان بررسی و مورد تایید واقع شده است (بیرد، یون، ونتیسینکیو، شپرد و گویر^۲، ۲۰۲۲).

با توجه به آنچه بیان شد، شواهد تجربی مناسبی در دسترس است که موید کاهش همدلی و توانایی در ک هیجان چهره در مصرف کنندگان مواد است. اما نکته مورد نظر این پژوهش پایداری عوارض مصرف مواد است. اخیرا از نظر بالینی اعتیاد را دارای عوارض مزمن وابسته به زمان معرفی می‌کنند (اولسن^۳، ۲۰۲۲). این امر بدان معناست که بسیاری از عوارض اعتیاد ممکن است از یک سو، با افزایش طول زمان مصرف حادتر و شدیدتر شوند؛ و از سوی دیگر در طول زمان درمان (ترک مواد) به تدریج بهبود یافته و میزان بهبودی با زمان درمان همبسته باشد (سیسیلی و همکاران، ۲۰۲۲). صاحب نظران بیان می‌کنند که مصرف مواد مختلف با توجه به اثرات مخربی که بر مغز و سیستم عصبی وارد می‌نماید، عوارض روان‌شناختی متفاوتی را موجب می‌شوند که ممکن است رشد اصلاح و بهبودی آنها در زمان ترک متفاوت بوده و حتی برخی از موارد هرگز بهبودی کامل نیابند (تولومئو و یو^۴، ۲۰۲۲). در همین راستا و با توجه به ادبیات پژوهشی موجود، نویسنده‌گان این مقاله تاکنون تحقیقی را نیافتد که به بررسی تغییرات همدلی و در ک هیجان چهره در زمان ترک و درمان پرداخته باشد. بنابراین به منظور توجه به این خلاصه پژوهشی، هدف پژوهش حاضر مقایسه همدلی و در ک هیجان چهره افراد سالم با افراد وابسته به مواد در طول دوره درمان بوده است و افراد را در سه دوره زمانی ۲ ماه، شش ماه و یک سال درمان مورد بررسی قرار داده است.

1. Bayrakçı

2. Beard, Yoon, Venticinque,
Shepherd & Guyer

3. Olsen

4. Tolomeo & Yu

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

روش پژوهش حاضر مقایسه‌ای و از نوع مطالعات طولی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به مواد تحت درمان در کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر تهران در سال ۱۴۰۰ و افراد سالم از خانواده آنها بود. حجم نمونه اولیه شامل ۱۵۰ نفر بود که در سه گروه شامل ۵۰ فرد سالم، ۵۰ نفر وابسته به مواد مخدر (شامل تریاک و هروئین) و ۵۰ نفر وابسته به مواد محرک (شیشه و کوکائین) تقسیم شدند. در پژوهش‌های مقایسه‌ای (با اندازه‌گیری مکرر و یا گروه‌های مستقل، تعداد هر گروه باید حداقل ۳۰ نفر باشند (دلاور، ۱۴۰۱). در این پژوهش با پیش‌بینی افت آزمودنی در طول زمان، تعداد بیشتری در نظر گرفته شد. افراد نمونه به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به این منظور کلینیک‌هایی که حاضر به همکاری بودند، افراد در حال درمان را معرفی نمودند و به صورت حضوری و یا تماس تلفنی درخواست همکاری و شرکت در پژوهش داده شد که ۱۵۰ نفر بر اساس ملاک‌های پژوهش انتخاب گردیدند. ملاک‌های ورود گروه نمونه عبارت بود از مرد بودن، زمان مصرف حداقل ۱ سال و حداقل ۵ سال، سن بین ۲۰ تا ۵۰ سال، و زمان درمان موفق (ترک) ۲ ماه بود. ملاک‌های خروج نیز شامل ابتلاء به اختلالات سایکوتیک، بی‌سودایی و وجود مشکلات حسی مانع از انجام تکالیف پژوهشی بود. حجم نمونه نهایی به علت مصرف مجدد، یا ترک پژوهش کاهش یافته و به ۱۰۲ نفر رسید که شامل ۳۴ نفر وابسته به مواد مخدر و ۶۸ نفر وابسته به مواد محرک و ۳۴ فرد سالم از خانواده‌های آنها بود. درمان این افراد شامل مصرف داروی نگهدارنده (متادون، اوپیوم، بوپرنورفین) و درمان‌های روان‌شناختی متتمرکز بر ترک مواد (عمدتاً شناختی-رفتاری) بود. در این پژوهش نکات اخلاقی از جمله محرمانه بودن اطلاعات، رضایت آگاهانه، حق خروج از پژوهش بدون تبعات مالی و درمانی، و حق آگاهی از نتایج رعایت شد. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌های مکرر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شد.

۱۱۸

118

۱۴۰۱، ۱۷، №۶۸، سال ۱۴۰۰، پژوهشی، پژوهشی

ابزار

۱- تکلیف بازشناسی هیجان^۱: آزمون بازشناسی هیجان برای ارزیابی توانایی تشخیص هیجان چهره توسط کسلز^۲ و همکاران در سال ۲۰۰۷ طراحی و ساخته شد. آزمون بازشناسی هیجان یک ابزار مبتنی بر رایانه است که در آن چهره زنان و مردانی با حالات هیجانی اصلی (تعجب، شادی، غم، ترس، انزجار، خشم) نمایش داده می‌شوند. این هیجان‌ها در ۵ درجه از شدت صفر (چهره خنثی و بدون هیجان است) تا ۱۰۰ (چهره کاملاً هیجان را نشان می‌دهد) طراحی شده‌اند. از آزمودنی خواسته می‌شود تا بعد از دیدن هر تصویر هیجان مربوط به آن را از میان شش گزینه (شش حالت هیجانی تعجب، شادی، غم، ترس، انزجار، خشم) تشخیص دهد. در تصویر زیر، مجموعه این تصاویر به نمایش درآمده است. در این پژوهش وضعیت صفر، یعنی چهره خنثی و بدون هیجان نمایش داده نشد. میزان حساسیت این آزمون توسط سازندگان بررسی شده و اندازه اثر آن در همه هیجانات، بزرگتر از ۱۴/۰ (بین ۰/۹۱ تا ۰/۹۱)، بدست آمد که مقدار قابل قبولی است (کسلز و همکاران، ۲۰۰۷). در ایران نیز این آزمون در پژوهش سادات رسول و علیزاده فرد (۲۰۲۲) با استفاده از عبارات فارسی تهیه شده و اندازه اثر آن برای همه هیجانات بین ۰/۱۷ تا ۰/۸۹ (بزرگتر از ۱۴/۰)، بدست آمد. همچنین همبستگی نمرات این آزمون با نمرات آزمون ذهن‌خوانی چشم‌های بارون-کوهن ۰/۸۴، محاسبه گردید و ضریب بازآزمایی آزمون بعد از ۱۵ روز برابر با ۰/۸۰ و میزان آلفای کرونباخ آن ۰/۷۳ بود (садات رسول و علیزاده فرد، ۲۰۲۲).

۱۱۹

۱۱۹

پال: مفهوم، مدل، مهندسی و تئوری
Vol. 17, No. 68, Summer 2023



۱۲۰
120

۱۴۰ تا ۱۷۰ میلیمتر، سال ۶۸، شماره ۲۰۲۳
Vol. 17, No. 68, Summer 2023

شکل ۱: تصاویر هیجانات اصلی ارائه شده در طول آزمون بازشناسی هیجان

- پرسشنامه همدلی: این آزمون توسط دیویس^۱ در سال ۱۹۸۳ طراحی شد و دارای ۲۱ گویه است که میزان همدلی را در افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. نمره گذاری این آزمون بر اساس لیکرت ۵ درجه‌ای کاملاً مخالفم (۱) تا کاملاً موافقم (۵) است و نمرات بالاتر نشان از همدلی بیشتر فرد دارد. این پرسشنامه دارای گویه‌هایی برای ارزیابی سه زیرمقیاس دغدغه همدلانه (مانند سوال ۱۵: وقتی می‌بینم کسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، احساس می‌کنم باید از او حمایت کنم)، دیدگاه گرایی (مانند سوال ۱۴: وقتی من از کسی ناراحتم، معمولاً سعی می‌کنم خود را چند لحظه جای او

بگذارم) و آشفتگی شخصی (مانند سوال ۲۱: من اغلب از چیزهایی که اتفاق می‌افتد، کاملاً متأثر می‌شوم) است. در پژوهش دیویس (۱۹۸۳) پایاپی آن بر اساس آلفای کرونباخ بالای ۰/۷۰ بدست آمد و اعتبار آزمون نیز با روش تحلیل عاملی ارزیابی و مطلوب گزارش شده بود. در ایران نیز فیض آبادی، فرزاد و شهرآرای (۱۳۸۶) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را از ۰/۶۸ تا ۰/۷۱ گزارش نموده و اعتبار آن را بر اساس تحلیل عاملی بررسی نموده و برای کاربرد در جامعه ایرانی مناسب گزارش نموده‌اند. در پژوهش دیگری نیز ضربی بازآزمایی این ابزار در جمعیت ایرانی ۰/۷۱ برآورد شده است (خدابخش و منصوری، ۱۳۹۱).

یافته‌ها

داده‌های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از لحاظ مشخصات جمعیت شناختی تعداد ۱۰۲ شرکت کننده در سه گروه (هر گروه ۳۴ نفر) بر اساس مولفه سن، سالهای مصرف و طول دوره درمان همتا شدند. طول دوره درمان برای افراد وابسته به مواد، دو ماه در آغاز پژوهش بود. متغیر سن در سه گروه توسط آزمون تحلیل واریانس و سالهای مصرف در دو گروه وابسته به مواد توسط آزمون بررسی شد و گروه‌ها بر اساس این سه متغیر همتا شدند. مشخصات جمعیت شناختی به تفکیک گروه‌های پژوهش در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱: مشخصات جمعیت شناختی به تفکیک گروه‌های پژوهش

	سن	سنوات مصرف مواد		میانگین انحراف استاندارد	میانگین انحراف استاندارد	گروه
		میانگین	انحراف استاندارد			
۱۲۱	-	-	-	۷/۱۰	۳۵/۰۲	افراد سالم
۱۲۱	۱/۲۲	۴/۲۰	F=۲/۸۰	۶/۲۱	۳۴/۷۳	وابسته به مواد
	t= ۰/۹۶۱					مخدر
	sig= ۰/۳۴۰	۱/۵۳	۳/۸۸	sig= ۰/۰۶۵	۶/۵۵	وابسته به مواد
					۳۱/۵۸	محرك

در جدول ۲ یافته‌های توصیفی آزمودنی‌ها شامل میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای همدلی و درک هیجانی در افراد وابسته به مواد بعد از دو ماه، شش ماه و یک سال درمان، با افراد سالم در دو گروه مواد مخدر و مواد محرک گزارش شده است.

جدول ۲: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش برای افراد سه گروه در سه زمان اندازه‌گیری

همدلی	درک هیجان			مرحله	گروه
	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین		
۹/۹۵	۵۳/۸۵	۱/۱۸	۱۴/۲۳	افراد سالم	بعد از دو ماه درمان
۲/۹۳	۴۲/۹۴	۱/۷۶	۱۰/۱۷	وابسته به مواد مخدر	(آغاز پژوهش)
۳/۵۴	۴۲/۰۸	۱/۳۹	۸/۳۸	وابسته به مواد محرک	
۱۳/۸۷	۵۰/۰۸	۱/۲۷	۱۵/۰۰	افراد سالم	بعد از شش ماه
۳/۸۸	۴۵/۲۹	۱/۵۸	۱۱/۵۰	وابسته به مواد مخدر	
۴/۰۴	۴۳/۸۲	۱/۹۹	۱۰/۱۷	وابسته به مواد محرک	درمان
۱۲/۹۵	۵۱/۰۲	۱/۶۹	۱۴/۵۵	افراد سالم	بعد از یک سال
۲/۳۲	۴۷/۲۹	۱/۰۱	۱۳/۳۵	وابسته به مواد مخدر	
۵/۲۸	۴۶/۱۴	۱/۱۰	۱۲/۲۳	وابسته به مواد محرک	درمان

۱۲۲

122

جهت بررسی داده‌ها ابتدا با کمک آزمون کلمو گروف اسمیرنوف مفروضه نرمال بودن داده‌ها به تایید رسید و سطح معناداری همه متغیرها بزرگتر از ۰/۰۵ بدست آمد. سپس تفاوت گروه‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر بررسی گردید. ابتدا پیش فرض‌های این تحلیل توسط آزمون کرویت موچلی، گرینهاوس گیسر و لامبدای ویکنر بررسی شدند که نتایج آن در جدول ۳ آمده است

جدول ۳: مفروضه‌های اندازه‌گیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر

متغیر	گروه						
	گروه	زمان	گروه × زمان	گروه	زمان	همدلی	گروه × زمان
ارزش سطح معناداری	۰/۰۰۰۱	۱۱۹/۳۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۷۳	۰/۰۳۰	۰/۰۸۰۴	
F	۰/۰۰۰۱	۸۳/۸۹	۰/۰۰۰۱	۰/۰۷۶	۰/۰۰۰۱	۰/۳۹۳	درک
ارزش سطح معناداری	۰/۰۰۰۱	۲۱/۰۹	۰/۰۰۰۱	۰/۲۵۲	۰/۰۰۰۱	۰/۲۳۰	هیجان
ارزش سطح معناداری	۰/۰۰۰۱	۳۹/۳۸	۰/۰۰۱	۰/۳۷	۰/۰۰۰۱	۰/۰۵۹	
ارزش سطح معناداری	۰/۱۱۹	۲/۲۰	۰/۱۲۲	۰/۰۸۷	۰/۰۹۲	۰/۰۹۹	زمان
ارزش سطح معناداری	۰/۱۲۹	۲/۰۴	۰/۱۶۹	۰/۰۸۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۷	گروه × زمان

همان‌طور که در جدول ۳ مشخص است آماره موجلی در سطح معناداری 0.05 معنادار نیست و پیش فرض تساوی واریانس‌ها رعایت شده است. همچنین معناداری آماره‌های گرینهاؤس گیسر و لامبدای ویکلز به معنای معناداری کل مدل چندمتغیری است. در ادامه نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر 3×3 (سه گروه آزمایش در سه زمان اندازه‌گیری) بدست آمد که در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول ۴؛ نتایج تحلیل اندازه‌گیری مکرر متغیرهای پژوهش

مقیاس	منبع	میانگین مجددرات	F	سطح معناداری
	گروه	۹۵۷/۶۶	۳۴۳/۵۱	۰/۰۰۰۱
در ک هیجان	زمان	۳۰۶/۳۷۳	۱۵۰/۲۴	۰/۰۰۰۱
	گروه × زمان	۱۰۵/۸۸	۹۴/۱۳	۰/۰۰۰۱
	گروه	۲۹۷۴/۷۱	۵۴/۶۲	۰/۰۰۰۱
همدلی	زمان	۱۷۶/۹۶	۳/۷۵	۰/۰۶۱
	گروه × زمان	۴۰۲/۶۱	۳/۹۳	۰/۰۵۶

۱۲۳

123

چنان‌چه از جدول ۴ مشخص است، اثر گروه و زمان برای متغیر در ک هیجان معنادار است. همچنین اثر تعامل زمان و گروه نیز معنادار است. این امر به معنای آن است که نمرات هیجان در طول زمان با توجه به سه گروه شرکت کننده متفاوت است. همچنین مشخص می‌گردد که در متغیر همدلی تنها اثر در ک گروه‌بندی معنادار بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه تفاوت نمرات همدلی بین سه گروه شرکت کننده معنادار است، اما تغییر این نمرات در طول زمان معنادار نبوده است. برای بررسی این تغییرات از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که در جدول ۵ نشان داده شده است.

جدول ۵: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای متغیر در ک هیجانی و همدلی در سه مرحله پژوهش


زمان پژوهش	منبع تفاوت‌ها				
	همدلی	در ک هیجان	تفاوت میانگین سطح معناداری	تفاوت میانگین سطح معناداری	
۰/۰۰۰۱	۱۰/۹۱	۰/۰۰۰۱	۴/۰۵	سالم و مواد مخدر	
۰/۰۰۰۱	۱۱/۷۶	۰/۰۰۰۱	۵/۸۵	سالم و مواد محرک	بعد از دو ماه
۰/۸۴۴	۰/۸۵	۰/۰۰۰۱	۱/۷۹	مواد مخدر و مواد محرک	درمان
۰/۰۶۲	۴/۷۹	۰/۰۰۰۱	۳/۵۰	سالم و مواد مخدر	
۰/۰۱۰	۶/۲۶	۰/۰۰۰۱	۴/۸۲	سالم و مواد محرک	بعد از شش ماه
۰/۷۶۳	۱/۴۷	۰/۰۰۰۴	۱/۳۲	مواد مخدر و مواد محرک	ماه درمان
۰/۱۵۰	۳/۷۳	۰/۰۰۱	۱/۲۰	سالم و مواد مخدر	
۰/۰۴۱	۴/۸۸	۰/۰۰۰۱	۲/۳۲	سالم و مواد محرک	بعد از یک سال
۰/۸۳۲	۱/۱۴	۰/۰۰۲	۱/۱۱	مواد مخدر و مواد محرک	سال درمان

مندرجات جدول ۵ نشان می‌دهند که در ابتدای پژوهش نمرات در ک هیجان دو گروه وابسته به مواد در تمامی مراحل با هم تفاوت معنادار داشته و هر دو کمتر از گروه افراد سالم بوده است. اگرچه در طول زمان نمرات در ک هیجان دو گروه افزایش یافته و تفاوت آن با نمرات گروه سالم کمتر شده است، اما کماکان به سطح نمره افراد سالم نرسیده و تفاوت معناداری با گروه افراد سالم دارد. از سوی دیگر نمرات افراد وابسته به مواد محرک نیز در همه مراحل کمتر از گروه مصرف کننده مواد مخدر است. این نتایج در نمودار ۱ نیز به نمایش درآمده است.

۱۲۴


124

۱۴. Vol. 17, No. 68, Summer 2023



نمودار ۱: مقایسه نمرات در ک هیجان سه گروه در مراحل مختلف پژوهش

همچنین جدول ۵ نشان می‌دهد که در ابتدای پژوهش نمرات همدلی دو گروه وابسته به مواد با هم تفاوتی نداشتند و هر دو گروه کمتر از گروه افراد سالم بودند است. اما در طول زمان نمرات همدلی دو گروه افزایش یافته و بعد از شش ماه دیگر تفاوتی بین نمرات گروه وابسته به مواد مخدر یا افراد سالم وجود ندارد. این درحالی است که نمرات گروه وابسته به مواد محرک اگرچه افزایش یافته ولی حتی بعد از یک سال هم با نمرات افراد سالم تفاوت معنادار داشته و کمتر است. این نتایج در نمودار ۲ نیز مشخص است.



نمودار ۲: مقایسه نمرات در ک همدلی سه گروه در مراحل مختلف پژوهش

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه همدلی و در ک هیجانی افراد وابسته به مواد تحت درمان بعد از دو ماه، شش ماه و یک سال با افراد سالم بوده است. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که اگرچه در آغاز در ک هیجان و همدلی افراد وابسته به مواد مخدر از افراد سالم کمتر است، اما در طول زمان درمان این توانایی‌ها بهبود می‌یابد. در ادامه به تبیین نتایج پرداخته و به طور خاص بر ادبیات پژوهشی برآمده از نتایج تصویربرداری عصبی تمرکز شده است که آسیب‌های شناختی و هیجانی مصرف مواد را بررسی نموده‌اند.

یافته‌های برآمده از این پژوهش نشان داد که در زمان آغاز پژوهش یعنی ۲ ماه پس از درمان، در ک هیجان و همدلی افراد وابسته به مواد مخدر و محرک دارای تفاوت معناداری

با افراد سالم است. این یافته با نتایج سایر پژوهشگران در این زمینه همسو است. برای مثال می‌توان به نتایج پژوهش نجاتی و همکاران (۱۳۹۱) مبنی بر مقایسه توانایی در ک هیجان و ذهن خوانی افراد سالم با مصرف کنندگان مواد افیونی؛ پناهی (۱۳۹۵) مبنی بر مقایسه بازشناسی هیجان چهره در افراد وابسته به مواد سنتی و صنعتی؛ پورشیرازی و نصرالهی (۱۴۰۰) درباره مقایسه بیان هیجان به عنوان یکی از مولفه‌های هوش هیجانی در افراد سالم و وابسته به مواد؛ رضایی و حسن‌زاده (۱۳۹۶) درباره بررسی پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر، و پژوهش ناظری رضا‌آباد، جمالپور، عالم‌رجی، نوذری و رضوی‌نسب (۲۰۲۰) درباره اثر مصرف مزمن مواد بر همدلی شناختی در ایران اشاره نمود. همچنین پژوهش بایراکچی و همکاران (۲۰۱۵) درباره ناتوانی بازشناسی هیجان چهره در مصرف کنندگان کتابیس، راینسون و همکاران (۲۰۱۸) مبنی بر کاهش همدلی در اعتیاد به مواد مخدر و الکل؛ کاکس و ریچل (۲۰۲۳) درباره بروز نقص همدلی در اعتیاد؛ بایز و همکاران (۲۰۲۱) مبنی بر نواقص همدلی و عوارض ناشی از آن در اعتیاد به کوکائین؛ و اونال-آیدین و همکاران (۲۰۲۰) درباره اثرات نقص بازشناسی هیجان در شبکه اجتماعی معتادان در خارج از ایران نیز با این یافته پژوهشی همسو هستند. این نتایج را می‌توان به اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار و عملکرد مغز مرتبط دانست. یکی از نواحی مهم که در اثر مصرف طولانی مواد، تغییرات ساختاری قبل توجهی می‌یابد، نواحی مربوط به احساسات و هیجان‌ها است. مطالعات تصویربرداری عصبی یک شبکه تخصصی مربوط به مغز اجتماعی، متشكل از قشر پیش‌پیشانی داخلی، قشر اوریوتوفrontal، اینسولا، آمیگدال و شکنج دوکی شکل را مشخص می‌کنند که از شناخت اجتماعی پشتیبانی می‌کند (آدولفس^۱؛ چودری، بلکمور و چارمن^۲؛ ۲۰۰۶؛ دالمونت^۳ و همکاران، ۲۰۱۳). مطالعات تصویربرداری تایید می‌کنند که مصرف مواد مخدر و محرك ک موجب کاهش حجم ماده خاکستری در سراسر این نواحی به ویژه ناحیه قشری پیشانی و پیش‌پیشانی در اثر مصرف مواد مخدر می‌گردد. تغییر الگوهای حجمی به خصوص در ناحیه قشر پیشانی یک

1. Adolphs

3. Dal Monte

2. Choudhury, Blakemore & Charman

اثر تجمعی را برای استفاده از مواد نشان می‌دهد، به طوری که هر چه استفاده طولانی تر شود، حجم ماده خاکستری کاهش بیشتری می‌یابد. جالب آن که در پژوهشی افرادی که مصرف کتند گان تفریحی و گاه به گاه مواد مخدر بودند با افراد معتاد و افراد سالم مقایسه شدند (یپ^۱ و همکاران، ۲۰۱۸) و نتایج نشان داد که مصرف تفریحی (بهخصوص مواد محرک) باز هم موجب کاهش ماده خاکستری به ویژه در نواحی کورتکس سینگولیت قدامی^۲ و قشر پیشانی حدقه‌ای^۳ می‌شود؛ اگرچه میزان آن کماکان بیشتر از افراد معتاد است. این امر نشان می‌دهد که یکپارچگی بافت پیش‌پیشانی همچنین ممکن است نشانگری برای تاب آوری در اعتیاد هم باشد (کانلی، بل، فاکس و گاراوان^۴، ۲۰۱۳). همچنین مصرف مواد دارای پتانسیل ایجاد التهاب عصبی هستند که اتصالات ماده سفید مغز در برابر آن آسیب‌پذیر است (کوسیک، ناپیر و کاروی^۵، ۲۰۱۲). این امر موجب کاهش انسجام (جدما^۶ و همکاران، ۲۰۲۱) و بی‌نظمی‌های ساختاری (سوارس، مارکوس، الوز و سوسا^۷، ۲۰۱۳) در ماده سفید مغز می‌گردد. این اثرات به شکل آسیب در رشته‌های آکسونی به‌ویژه در غلاف میلین مشهود است (سانگ^۸ و همکاران، ۲۰۰۵). درواقع، مصرف مواد موجب کاهش میزان پروتئین‌های میلین می‌شود، امری که به آسیب آکسونی منتهی خواهد شد. بیشترین نواحی مغز که ماده سفید آنها در اثر مصرف مواد آسیب می‌بیند شامل جسم پینه‌ای، مسیرهای عصبی پیشانی، پیش‌پیشانی، و قشر حرکتی به پیشانی است؛ نواحی که با پردازش هیجانی در بازشناسی هیجان و همدلی نیز ارتباط دارند (بیزا-لویا^۹ و همکاران، ۲۰۱۶؛ ساوجانی^{۱۰} و همکاران، ۲۰۱۴؛ همپتون، هانیک و اولسون^{۱۱}، ۲۰۱۹). از سوی دیگر پژوهش‌ها حاکی از آن است که مصرف مواد بر ساخت‌وساز گلوکز در مغز بهخصوص در ناحیه حدقه‌ای پیشانی موثر بوده و موجب کاهش کمتر آن

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Yip | 7. Soares, Marques, Alves & Sousa |
| 2. anterior cingulate cortex | 8. Song |
| 3. orbitofrontal cortex | 9. Baeza-Loya |
| 4. Connolly, Bell, Foxe & Garavan | 10. Savjani |
| 5. Kousik, Napier & Carvey | 11. Hampton, Hanik & Olson |
| 6. Jedema | |

می‌گردد (اسمیت، بوریج، نادر، نادر و پورینو^۱، ۲۰۱۹)؛ امری که نشان‌دهنده اختلال عملکردی در این ناحیه است. قبل اشاره شد که ناحیه حدقه‌ای پیشانی از قسمت‌های مهمی است که در کارکردهای شناخت اجتماعی مانند درک هیجان و همدلی نقش بسزایی دارد (سیسیلی و همکاران، ۲۰۲۲). این تغییر همراه با کاهش غلظت انتقال‌دهندهای مهم دوپامین (مولر، توماسی، هونوریو، ولکو و گلداشتاین^۲، ۲۰۱۲) و سروتونین (راجرز^۳ و همکاران، ۱۹۹۹) در همین ناحیه است. این تغییرات عصبی-شیمیایی نیز موجب اختلال در کارکرد قشر حدقه‌ای پیشانی شده و توانایی بازشناسی هیجان و همدلی را کاهش دهد. این یافته‌ها در پژوهش‌های مختلف و در رابطه با مصرف مواد مختلفی مانند الکل (کاگ^۴ و همکاران، ۲۰۱۸)، مواد مخدر افیونی (لیو^۵ و همکاران، ۲۰۰۴)، کوکائین (کاگ و همکاران، ۲۰۱۸)، آمفاتامین (لدرر، فوچه، ویلسون، استی و اولمان^۶، ۲۰۱۶)، حشیش (فیلبی^۷ و همکاران، ۲۰۱۴)، هروئین (ولمن^۸ و همکاران، ۲۰۱۵) و حتی تباکو (کاگ و همکاران، ۲۰۱۸) مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین نقص همدلی و درک هیجان در مصرف کنندگان مواد را می‌توان به تغییرات ساختاری و عصبی-شیمیایی در مغز نسبت داد.

همچنین در ادامه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در طول زمان درمان، همدلی افراد وابسته به مواد مخدر و محرك افزایش یافته است، به طوری که پس از شش ماه، همدلی گروه وابسته به مواد مخدر دیگر تفاوتی با افراد سالم نداشت. خوشبختانه این نتایج بعد از یک سال نیز کماکان حفظ شده و نمرات همدلی هر دو گروه افزایش بیشتری یافته بود؛ ولی سطح همدلی افراد وابسته به مواد محرك بعد از گذشت یک سال نیز علیرغم افزایش چشمگیر، هنوز به سطح افراد سالم و افراد وابسته به مواد مخدر نرسیده بود. همچنین توانایی درک هیجان نیز در طول زمان برای هر دو گروه مشهود بود اما حتی پس از

1. Smith, Beveridge, Nader, Nader & Porrino
2. Moeller, Tomasi, Honorio, Volkow & Goldstein
3. Rogers
4. Kaag

5. Lyoo
6. Lederer, Fouche, Wilson, Stein & Uhlmann
7. Filbey
8. Wollman

گذشت یک سال نیز کماکان نمرات دو گروه با افراد سالم تفاوت معناداری داشت. این در حالی بود که در ک هیجان گروه مواد محرک نیز در تمام مراحل کمتر از گروه وابسته به مواد مخدر بود. براساس ادبیات پژوهشی موجود، در ایران تحقیق مشخصی بر روی تغییرات همدلی در زمان ترک مواد صورت نگرفته است، اما این نتایج با برخی از پژوهش‌های دیگر به شکل غیرمستقیم ارتباط دارد. برای مثال می‌توان به پژوهش قربانی و همکاران (۱۳۹۷) مبنی بر اثر توانمندسازی شناختی بر بازشناسی هیجان چهره در افراد وابسته به مواد؛ قربانی (۱۳۹۷) مبنی بر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر هیجان چهره و همدلی افراد مصرف کننده مواد؛ نریمانی، عیوضی و ابوالقاسمی (۱۳۹۳) مبنی بر آموزش هوش هیجانی بر بیان هیجان، همدلی و دیدگاه‌گیری دانش آموزان وابسته به مواد؛ ریاحی نیا و صفری (۱۳۹۹) درباره اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت، بر سازگاری اجتماعی مردان مصرف کننده مواد مخدر همسو است. همچنین این نتایج با پژوهش ماسی، نیومارک و کسلگ^۱ (۲۰۱۷) درباره تغییرات همدلی در روند مصرف و ترک مواد مخدر؛ کوئیدنو (۲۰۱۷) مبنی بر تعامل مهارت‌های شناخت اجتماعی از جمله در ک هیجان و همدلی در روند ترک مواد؛ پژوهش چن^۲ (۲۰۱۹) درباره نقش همدلی نسبت به خود و دیگران در فرایند ترک مواد؛ پژوهش فراتحلیل بوچر، سوزوکی و ساموئل^۳ (۲۰۱۹) مبنی بر نتایج درمان و ترک مواد بر خصوصیات شناختی- اجتماعی (مانند همدلی و در ک هیجان)، و پژوهش برواینجن^۴ و همکاران (۲۰۱۹) درباره نتایج درمان مصرف مواد مانند افزایش همدلی که دارای نقش پیشگیری از عود مجدد هستند، نیز همسو است. برای تبیین این نتایج می‌توان به بهبودی وابسته به زمان مواد اشاره نمود. چنانچه در بالا بیان شد اثرات مصرف مواد مخدر موجب تغییرات عملکردی و ساختاری متعددی مانند کاهش حجم ماده سفید و خاکستری، کاهش سوخت‌ساز گلوکر و تغییراتی در غلظت انتقال‌دهنده‌های مهم عصبی در مغز می‌شوند. شواهد عصب‌شناسی و تصویربرداری عصبی مشخص نموده است که حجم قشر خاکستری به‌واسطه ترک مواد

۱۲۹

۱۲۹

پژوهش‌های
نمایه شده،
شماره ۸۷،
تابستان ۱۴۰۲
Vol. 17, No. 68, Summer 2023

1. Massey, Newmark & Wakschlag
2. Chen

3. Bucher, Suzuki & Samuel
4. Bruijnen

ترمیم شده و افزایش می‌یابد؛ بهطوری که دوره‌های درمان و ترک با افزایش قشر خاکستری بهویژه در قشر پیشانی، اینسولا و مخچه همراه است (کانولی و همکاران، ۲۰۱۳؛ هایزیگر^۱ و همکاران، ۲۰۱۹؛ پرواز و همکاران، ۲۰۱۷). بهبود ساختاری وابسته به ترک مواد، ممکن است منعکس کننده افزایش رشد و جوانه‌زنی دندانیتی و حجم سلول‌های عصبی باشد (سیمن، گیانوتی، مک‌فادین، اسکوفیلد و مک‌گیتنی^۲؛ زهر^۳ و همکاران، ۲۰۱۰). همچنین افزایش پروتئین میلینی موجب بهبود وضعیت آكسونی می‌گردد (سانگ و همکاران، ۲۰۰۵). بسیاری از پژوهش‌ها، بازگشت و بهبود انعطاف‌پذیری عصبی را ناشی از افزایش و بهبود بازیابی متابولیکی عصبی می‌دانند (سیمن و همکاران، ۲۰۱۹؛ زهر و همکاران، ۲۰۱۰؛ کالیواس^۴، ۲۰۰۷). اگرچه بیشتر پژوهش‌ها نشان‌دهنده بهبود عوارض ناشی از تغییرات ساختاری و عملکردی مغز بر اثر مصرف مواد هستند، اما روند بهبود، تابعی از نوع ماده مصرفی و زمان قطع یا کاهش مصرف مواد است. برای مثال حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی در معتادان به الکل از یک ماه پس از قطع مصرف افزایش می‌یابد و تقریباً پس از ۷ ماه به میانگین حجم قشر پیشانی در افراد سالم می‌رسد (دورازو، مان، گازدزینسکی، یه و میرهاف^۵، ۲۰۱۵)؛ این در حالی است که در مصرف کنندگان کوکائین، حتی با کاهش ۱۰ درصدی مصرف نیز در یک بازه زمانی ۶ ماهه، اثراتی از بهبود وضعیت حجم ماده خاکستری دیده نمی‌شود (هایزیگر و همکاران، ۲۰۱۹). درواقع، مصرف مواد مختلف به همان شکل که عوارض متفاوتی بر کار کرد عصبی می‌گذارند، در دوره ترک مصرف نیز روند و سرعت بهبودی متفاوتی را طی می‌کنند. تفاوت نتایج مربوط به روند بهبودی همدلی و درک هیجان نیز از همین امر ناشی می‌شود. از نظر عصب‌شناختی همدلی مربوط به مناطقی در آمیگدا، کورتکس سینگولیت قدامی و قشر پیشانی حدقه‌ای است. مشاهدات تصویربرداری نشان داده‌اند که این مناطق بسیار تحت تاثیر تغییرات مصرف قرار دارند و بازسازی مناطق

1. Hirsiger

2. Siemsen, Giannotti, McFaddin,
Scofield & McGinty

3. Zahr

4. Kalivas

5. Durazzo, Mon, Gazdzinski, Yeh &
Meyerhoff

آسیب دیده در این نواحی در زمان کوتاه‌تری سپری می‌گردد. در مقابل مشاهدات تصویربرداری عصبی، مشخص ساخته که روند بهبود در نواحی دیگر کندتر است. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که مصرف طولانی (بیش از یک سال) مواد ممکن است اثرات طولانی مدت و حتی دائمی جبران‌ناپذیری بر ساختار و عملکرد مغز به‌ویژه در پیوند گاه‌های لوب‌های گیجگاهی بر جای گذارد. برای مثال عوارض مصرف مواد در نواحی لوب گیجگاهی-پس‌سری، نواحی گیجگاهی قدامی و خلفی حتی پس از ۸ ماه ترک مواد نیز همچنان به عملکرد افراد سالم نرسیده است (برواینجن و همکاران، ۲۰۱۹). برخی از این نواحی شامل همان مناطقی هستند که با توانایی در که هیجان مرتبط بوده و آسیب به آنها موجب مشکلاتی در درک هیجان چهره دیگران می‌شود. بنابراین می‌توان روند کند تغییرات و بهبودی در که هیجان در پژوهش حاضر را نیز ناشی از تفاوت روند سرعت بهبودی در نواحی عصبی مربوطه دانست. از سوی دیگر، نوع ماده مصرفی نیز در روند بهبودی موثر است. اگرچه برخی از پژوهش‌ها بیان می‌دارند که روند بازگشت در مصرف مواد محرك سریع‌تر از سایر مواد است (سیسیلی و همکاران، ۲۰۲۲)، اما بیشتر شواهد تجربی نشان از اثرات گستردگر و ماندگارتر مواد محرك نسبت به مواد مخدر، به خصوص در نواحی گیجگاهی و شکنج دوکی شکل دارند (برواینجن و همکاران، ۲۰۱۹). برای مثال پژوهش هنری، مازور و راندل^۱ (۲۰۰۹) نشان داد که در افراد مصرف کننده مواد محرك، حتی پس از ۶ ماه درمان نیز کماکان بازشناسی حالات هیجانی چهره با مشکل روپرست. همچنین فویسی^۲ و همکاران (۲۰۰۷) نیز نشان دادند که بر اثر مصرف برخی از مواد مانند الكل ممکن است شناسایی هیجان تا ۳ ماه بعد از ترک نیز کماکان با مشکل روپرست باشد. بنابراین می‌توان تفاوت بهبود توانایی در که هیجان چهره را وابسته به اثرات متفاوت مواد مخدر و محرك دانست.

این پژوهش یکی از محدود موارد تحقیق طولی بر روی تغییرات شناخت اجتماعی افراد مصرف کننده مواد تحت درمان بوده و از این نظر در نوع خود از نوآوری بالایی برخوردار است؛ اما مانند همه تحقیقات با محدودیت‌هایی نیز همراه بوده است. درواقع، انجام

1. Henry, Mazur & Rendell

2. Foisy

پژوهش به ویژه پژوهش‌های طولی بر روی این گروه با مشکلات زیادی همراه است که موجب بروز برخی محدودیت‌های اجرایی و پژوهشی می‌گردد. اولین محدودیت در شیوه همتا کردن گروه‌های پژوهشی بود. اگرچه این افراد بر اساس سن و طول دوره مصرف (افراد وابسته به مواد) همتا شدند، اما میزان مصرف جزئی از متغیرها نبود. از این جهت پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی به این متغیر مهم نیز توجه شود. عدم همراهی یافته‌های تصویربرداری مغزی در طول درمان نیز از محدودیت پژوهش بود. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات بعدی، یافته‌های بالینی با گزارشات تصویربرداری عصبی همراه شوند. همچنین اگرچه همه افراد نمونه تحت درمان و ترک مواد بودند اما سایر موارد مانند میزان مصرف نیکوتین (سیگار)، کافئین (قهوة و چای)، و انواع داروهای مسکن و جانبی (غیراعتیادآور) مورد بررسی و کنترل قرار نگرفت. پیشنهاد می‌شود در آینده این موارد نیز به عنوان متغیرهای کنترل مدنظر قرار گیرند. چهارمین مورد مربوط به میزان صداقت و ترک واقعی افراد نمونه بود. راستی آزمایی این افراد بر اساس مصاحبه بالینی با فرد و خانواده (والدین یا همسر) انجام گرفت. پیشنهاد می‌شود بررسی‌های پاراکلینیکی نیز به شیوه راستی آزمایی افزوده گردد. آخرین محدودیت نیز مربوط به عدم کنترل سبک زندگی افراد نمونه بود. شناخت اجتماعی، متغیری است که بستگی به میزان روابط اجتماعی افراد دارد. سطح روابط اجتماعی افراد، محرك‌های اجتماعی، غنی بودن محیط، انزوا و شیوه زندگی، و حتی سبک تغذیه و تحرک فردی از جمله عوامل مهم سبک زندگی هستند که بر شناخت اجتماعی تاثیرگذارند ولی در این پژوهش کنترل نشده بود، که پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات آتی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

منابع

- پناهی، احمد (۱۳۹۵). مقایسه بازشناسی هیجانی چهره‌ای و تکانشگری بین افراد وابسته به مواد مخارج‌ستی و صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد نجف آباد.
- پورشیرازی، کیمیا و نصراللهی، بیتا (۱۴۰۰). مقایسه هوش هیجانی، تحریفات شناختی و رفتار اجتماعی بین افراد وابسته و غیروابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی، ۱۵(۵۹)، ۲۲۷-۲۵۰.

خدابخش، محمدرضا و منصوری، پروین (۱۳۹۰). همدلی و بازبینی نقش آن در بهبود روابط پژوهشکاری اخلاق و تاریخ پژوهشکی ایران، ۴(۳)، ۴۶-۳۸.

دلاور، علی (۱۴۰۱). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ پنجم. تهران: ویرایش روان. رضایی، شهین و حسن زاده، رمضان (۱۳۹۶). مقایسه آلکسی تایمی، رفتار خودآسیبی و پردازش هیجانی در معتادین به مواد مخدر تک ماده‌ای و افراد بهنجار. *فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی*، ۳(۱)، ۱۰۱-۱۰۹.

ریاحی نیا، اکرم و صفری، یدالله (۱۳۹۹). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سبک دلستگی، سازگاری زناشویی و سازگاری اجتماعی در مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر. *مجله دانشکده پژوهشکی دانشگاه علوم پژوهشکی مشهد*، ۵(۶۳)، ۲۸۹۲-۲۹۰۱.

صرامی، حمیدرضا (۱۴۰۰). سخن اول. *فصلنامه اعتیادپژوهی*، ۱۵(۶۰)، ۱-۱.

فیسک، سوزان و تیلور، اشلی (۱۴۰۰). شناخت اجتماعی: از مغز تا فرهنگ. ترجمه سوسن علیزاده فرد، حسین زارع و زهره راضی. تهران. انتشارات آییش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۱۷).

فیض آبادی، زهرا؛ فرزاد، ولی الله و شهرآرای، مهرناز (۱۳۸۶). بررسی رابطه همدلی با سبک‌های هویت و تعهد در دانشجویان رشته‌های فنی و علوم انسانی. *مطالعات روان‌شناسی*، ۳(۲)، ۶۵-۹۰.

قریانی، سارا (۱۳۹۷). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبنی بر الگوی مارلات و درمان پیشگیری از بازگشت برپایه ذهن آگاهی در میزان تنظیم هیجان، همدلی، رفتار جامعه پسند، شناخت اجتماعی (هیجان چهره‌ای)، بهزیستی اجتماعی و پیشگیری از عود در مصرف کنندگان. پایان‌نامه دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور.

قریانی، مجید؛ نجفی، محمود؛ نجاتی، وحید و محمدی فر، محمدعلی (۱۳۹۷). اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در افراد وابسته به مواد. *فصلنامه اعتیادپژوهی*، ۱۲(۵۰)، ۲۵۳-۲۷۶.

نجاتی، وحید؛ شیری، اسماعیل و نوری، ژاله (۱۳۹۱). مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی و ذهن‌خوانی در افراد مصرف کننده موادافیونی و همتایان سالم. *فصلنامه اعتیاد پژوهی*، ۶(۲۱)، ۱۹-۳۰.

نریمانی، محمد؛ عیوضی، نسرین و ابوالقاسمی، عباس (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از گرایش دانش‌آموزان به سو استفاده از مواد. *فصلنامه اعتیادپژوهی*، ۳۰، ۲۰-۹.

نوجوان، نصرت؛ سلیمانی، اسماعیل و عیسی زادگان، علی (۱۴۰۱). اثربخشی مداخله پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ولع مصرف و پردازش هیجانی در افراد وابسته به مواد در مرحله بازتوانی غیر دارویی. *فصلنامه اعتمادپذوهی*، ۱۶(۶۵)، ۹۶-۷۵.

References

- Adolphs, R. (2009). The social brain: neural basis of social knowledge. *Annual review of psychology*, 60, 693–716.
- Adriaense, J. E. C., Koski, S. E., Huber, L., & Lamm, C. (2020). Challenges in the comparative study of empathy and related phenomena in animals. *Neuroscience & biobehavioral reviews*, 112, 62-82.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). US: American Psychiatric Association.
- Baez, S., Fittipaldi, S., De La Fuente, A. L., Carballo, M., Ferrando, R., García-Cordero, I., Campo, C. G., Garcia, A. M., Sedeño, L., & Ibáñez, A. (2021). Empathy deficits and their behavioral, neuroanatomical, and functional connectivity correlates in smoked cocaine users. *Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry*, 110, 110-128.
- Baeza-Loya, S., Velasquez, K. M., Molfese, D. L., Viswanath, H., Curtis, K. N., Thompson-Lake, D. G. Y., & Salas, R. (2016). Anterior cingulum white matter is altered in tobacco smokers. *The American journal on addictions*, 25(3), 210-214.
- Bayrakçı, A., Sert, E., Zorlu, N., Erol, A., Sarıcıçek, A., & Mete, L. (2015). Facial emotion recognition deficits in abstinent cannabis dependent patients. *Comprehensive psychiatry*, 58, 160-164.
- Beard, S. J., Yoon, L., Venticinque, J. S., Shepherd, N. E., & Guyer, A. E. (2022). The brain in social context: A systematic review of substance use and social processing from adolescence to young adulthood. *Developmental cognitive neuroscience*, 57, 101-127.
- Bell, M. D., Bryson, G. J., Greig, T. C., Fiszdon, J. M., & Wexler, B. E. (2005). Neurocognitive enhancement therapy with work therapy: productivity outcomes at 6- and 12month follow-ups. *Journal of rehabilitation research and development*, 42(6), 829-838.
- Bruijnen, C. J., Dijkstra, B. A., Walvoort, S. J., Markus, W., VanDerNagel, J. E., Kessels, R. P., & De Jong, C. A. (2019). Prevalence of cognitive impairment in patients with substance use disorder. *Drug and alcohol review*, 38(4), 435-442.
- Bucher, M. A., Suzuki, T., & Samuel, D. B. (2019). A meta-analytic review of personality traits and their associations with mental health treatment outcomes. *Clinical psychology review*, 70, 51-63.
- Ceceli, A. O., Bradberry, C. W., & Goldstein, R. Z. (2022). The neurobiology of drug addiction: cross-species insights into the dysfunction and recovery of the prefrontal cortex. *Neuropsychopharmacology*, 47, 276–291.

- Chen, G. (2019). The role of self-compassion in recovery from substance use disorders. *OBM integrative and complementary medicine*, 4(2), 1-14.
- Choudhury, S., Blakemore, S. J., & Charman, T. (2006). Social cognitive development during adolescence. *Social cognition and affective neuroscience*, 1, 165–174.
- Connolly, C. G., Bell, R. P., Foxe, J. J., & Garavan, H. (2013). Dissociated grey matter changes with prolonged addiction and extended abstinence in cocaine users. *PLoS One*, 8, 596-605.
- Cox, S. S., & Reichel, C. M. (2023). The intersection of empathy and addiction. *Pharmacology biochemistry and behavior*, 222, 173-189.
- Dal Monte, O., Krueger, F., Solomon, J. M., Schintu, S., Knutson, K. M., Strenziok, M., Pardini, M., Leopold, A., Raymont, V., & Grafman, J. (2013). A voxel-based lesion study on facial emotion recognition after penetrating brain injury. *Social cognition and affective neuroscience*, 8, 632–639.
- Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of personality and social psychology*, 44, 113-126.
- De Waal, F., & Preston, S. (2017). Mammalian empathy: Behavioural manifestations and neural basis. *Nature reviews neurosciences*, 18, 498–509.
- Decety, J. (2015). The neural pathways, development and functions of empathy. *Current opinion in behavioral sciences*, 3, 1-6.
- Decety, J., Norman, G. J., Berntson, G. G., & Cacioppo, J. T. (2012). A neurobehavioral evolutionary perspective on the mechanisms underlying empathy. *Progress in neurobiology*, 98(1), 38-48.
- Durazzo, T. C., Mon, A., Gazdzinski, S., Yeh, P. H., & Meyerhoff, D. J. (2015). Serial longitudinal magnetic resonance imaging data indicate non-linear regional gray matter volume recovery in abstinent alcohol-dependent individuals. *Addiction biology*, 20(5), 956-967.
- Filbey, F. M., Aslan, S., Calhoun, V. D., Spence, J. S., Damaraju, E., Caprihan, A., & Segall, J. (2014). Long-term effects of marijuana use on the brain. *Proceedings of the national academy of sciences*, 111(47), 16913-16918.
- Foisy, M. L., Kornreich, C., Fobe, A., D'Hondt, L., Pelc, I., Hanak, C., & Philippot, P. (2007). Impaired emotional facial expression recognition in alcohol dependence: do these deficits persist with midterm abstinence?. *Alcoholism: clinical and experimental research*, 31(3), 404-410.
- Hampton, W. H., Hanik, I. M., & Olson, I. R. (2019). Substance abuse and white matter: findings, limitations, and future of diffusion tensor imaging research. *Drug and alcohol dependence*, 197, 288–298.

- Henry, J. D., Mazur, M., & Rendell, P. G. (2009). Social-cognitive difficulties in former users of methamphetamine. *British journal of clinical psychology*, 48(3), 323-327.

Hirsiger, S., Hänggi, J., Germann, J., Vonmoos, M., Preller, K. H., Engeli, E. J., & Quednow, B. B. (2019). Longitudinal changes in cocaine intake and cognition are linked to cortical thickness adaptations in cocaine users. *NeuroImage: clinical*, 21, 101-122.

Homer, B. D., Solomon, T. M., Moeller, R. W., Mascia, A., DeRaleau, L., & Halkitis, P. N. (2008). Methamphetamine abuse and impairment of social functioning: a review of the underlying neurophysiological causes and behavioral implications. *Psychological bulletin*, 134, 301-310.

Jedema, H. P., Song, X., Aizenstein, H. J., Bonner, A. R., Stein, E. A., Yang, Y., & Bradberry, C. W. (2021). Long-term cocaine self-administration produces structural brain changes that correlate with altered cognition. *Biological psychiatry*, 89(4), 376-385.

Kaag, A. M., Schulte, M. H. J., Jansen, J. M., Van Wingen, G., Homberg, J., Van Den Brink, W., Wiers, R. W., Schmaal, L., Goudriaan, A. E., & Reneman, L. (2018). The relation between gray matter volume and the use of alcohol, tobacco, cocaine and cannabis in male polysubstance users. *Drug and alcohol dependence*, 187, 186-194.

Kalivas, P. W. (2007). Neurobiology of cocaine addiction: implications for new pharmacotherapy. *American journal of addiction*, 16, 71-78.

Kessels, R. P. C., Gerritsen, L., Montagne, B., Ackl, N., Diehl, J., & Danek, A. (2007). Recognition of facial expressions of different emotional intensities in patients with frontotemporal lobar degeneration. *Behavioral neurology*, 18(1), 31-36.

Kim, S. J., Lyoo, I. K., Hwang, J., Chung, A., Hoon Sung, Y., Kim, J., Kwon, D. H., Chang, K. H., & Renshaw, P. F. (2005). Prefrontal grey-matter changes in short-term and long-term abstinent methamphetamine abusers. *International journal of neuropsychopharmacology*, 9, 221-228.

Kousik, S. M., Napier, T. C., & Carvey, P. M. (2012). The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation. *Frontiers pharmacology*, 3, 121-133.

Lederer, K., Fouche, J. P., Wilson, D., Stein, D. J., & Uhlmann, A. (2016). Frontal white matter changes and aggression in methamphetamine dependence. *Metabolic brain disease*, 31, 53-62.

Liu, Y., & Fu, G. (2021). Emotion recognition by deeply learned multi-channel textual and EEG features. *Future generation computer systems*, 119, 1-6.

Lyoo, I. K., Streeter, C. C., Ahn, K. H., Lee, H. K., Pollack, M. H., Silveri, M. M., & Kaufman, M. J. (2004). White matter hyperintensities in subjects with cocaine and opiate dependence and healthy comparison subjects. *Psychiatry research: neuroimaging*, 131(2), 135-145.

- Massey, S. H., Newmark, R. L., & Wakschlag, L. S. (2018). Explicating the role of empathic processes in substance use disorders: A conceptual framework and research agenda. *Drug and alcohol review*, 37(3), 316-332.
- Moeller, S. J., Tomasi, D., Honorio, J., Volkow, N. D., & Goldstein, R. Z. (2012). Dopaminergic involvement during mental fatigue in health and cocaine addiction. *Translational psychiatry*, 2(10), 1-10.
- Nazeri-Rezaabad, M., Jamalpoor, Z., Alemrajabi, M. S., Nozari, M., Razavinasab, M., & Nezhadi, A. (2020). Chronic Exposure to Morphine Leads to a Reduced Affective Pain Response in the Presence of Hyperalgesia in an Animal Model of Empathy. *Addiction and health*, 12(4), 251-258.
- Olsen, Y. (2022). What Is Addiction? History, Terminology, and Core Concepts. *Medical clinics of North America*, 106(1), 1-12.
- Parvaz, M. A., Moeller, S. J., D’Oleire Uquillas, F., Pflumm, A., Maloney, T., Alia-Klein, N., & Goldstein, R. Z. (2017). Prefrontal gray matter volume recovery in treatment-seeking cocaine-addicted individuals: a longitudinal study. *Addiction biology*, 22, 1391–1401.
- Quednow, B. B. (2017). Social cognition and interaction in stimulant use disorders. *Current opinion in behavioral sciences*, 13, 55-62.
- Rappaport, L. M., Nardo, N. D., Brotman, M. A., Pine, D. S., Leibenluft, E., Roberson-Nay, R., & Hettema, J. M. (2021). Pediatric anxiety associated with altered facial emotion recognition. *Journal of anxiety disorders*, 82, 102-132.
- Robinson, C., Fokas, K., & Witkiewitz, K. (2018). Relationship between empathic processing and drinking behavior in project MATCH. *Addictive behaviors*, 77, 180-186.
- Rogers, R. D., Everitt, B. J., Baldacchino, A., Blackshaw, A. J., Swainson, R., Wynne, K., & Robbins, T. W. (1999). Dissociable deficits in the decision-making cognition of chronic amphetamine abusers, opiate abusers, patients with focal damage to prefrontal cortex, and tryptophan-depleted normal volunteers: evidence for monoaminergic mechanisms. *Neuropsychopharmacology*, 20(4), 322-339.
- Sadatrasoul, S., & Alizadeh-Fard, S. (2022). Comparison of facial emotion recognition in alzheimer's dementia and frontotemporal dementia. *International journal of behavioral sciences*, 15(4), 261-267.
- Savjani, R. R., Velasquez, K. M., Thompson-Lake, D. G. Y., Baldwin, P. R., Eagleman, D. M., De La Garza II, R., & Salas, R. (2014). Characterizing white matter changes in cigarette smokers via diffusion tensor imaging. *Drug and alcohol dependence*, 145, 134-142.
- Siemsen, B. M., Giannotti, G., McFaddin, J. A., Scofield, M. D., & McGinty, J. F. (2019). Biphasic effect of abstinence duration following cocaine self-administration on spine morphology and plasticity-related proteins in

- prelimbic cortical neurons projecting to the nucleus accumbens core. *Brain structure and function*, 224, 741-758.
- Smith, H. R., Beveridge, T. J. R., Nader, M. A., & Porrino, L. J. (2019). Regionally-specific alterations in myelin proteins in nonhuman primate white matter following prolonged cocaine self-administration. *Drug and alcohol dependence*, 137, 143–147.
- Soares, J. M., Marques, P., Alves, V., & Sousa, N. (2013). A hitchhiker's guide to diffusion tensor imaging. *Frontiers in neuroscience*, 7, 31-45.
- Song, S. K., Yoshino, J., Le, T. Q., Lin, S. J., Sun, S. W., Cross, A. H., & Armstrong, R. C. (2005). Demyelination increases radial diffusivity in corpus callosum of mouse brain. *Neuroimage*, 26(1), 132-140.
- Tolomeo, S., & Yu, R. (2022). Brain network dysfunctions in addiction: a meta-analysis of resting-state functional connectivity. *Translational psychiatry*, 12(1), 28-41.
- Ünal-Aydın, P., Balıkçı, K., Sönmez, I., & Aydin, O. (2020). Associations between emotion recognition and social networking site addiction. *Psychiatry research*, 284, 112-123.
- Winters, D. E., Brandon-Friedman, R., Yepes, G., & Hinckley, J. D. (2016). Systematic review and meta-analysis of socio-cognitive and socio-affective processes association with adolescent substance use. *Drug and alcohol dependence*, 1(219), 108-119.
- Wollman, S. C., Alhassoon, O. M., Stern, M. J., Hall, M. G., Rompogren, J., Kimmel, C. L., & Perez-Figueroa, A. M. (2015). White matter abnormalities in long-term heroin users: a preliminary neuroimaging meta-analysis. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 41(2), 133-138.
- Yamada, Y., Inagawa, T., Hirabayashi, N., & Sumiyoshi, T. (2022). Emotion Recognition Deficits in Psychiatric Disorders as a Target of Non-invasive Neuromodulation: A Systematic Review. *Clinical EEG and neuroscience*, 53(6), 506-512.
- Yip, S. W., Worhunsky, P. D., Xu, J., Morie, K. P., Constable, R. T., Malison, R. T., & Potenza, M. N. (2018). Gray-matter relationships to diagnostic and transdiagnostic features of drug and behavioral addictions. *Addiction biology*, 23(1), 394-402.
- Zahr, N. M., Mayer, D., Rohlfing, T., Hasak, M. P., Hsu, O., Vinco, S., & Pfefferbaum, A. (2010). Brain injury and recovery following binge ethanol: evidence from *in vivo* magnetic resonance spectroscopy. *Biological psychiatry*, 67(9), 846-854.