

سوء مصرف مواد نیروزا، مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی در ورزشکاران استان تهران*

علی کاشی^۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

چکیده

هدف: هدف از اجرای این تحقیق بررسی شیوع سوء مصرف مواد نیروزا، مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی در ورزشکاران استان تهران بود. **روش:** این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه ورزشکاران دارای حداقل ۶ ماه سابقه فعالیت ورزشی استان تهران یود. از بین این افراد با روش نمونه‌گیری خوش‌ای چند مرحله‌ای تعداد ۸۰۶ پرسشنامه خودگزارش‌دهی، محقق ساخته و بدون نام (از ۳۹۴ زن و ۴۱۲ مرد ورزشکار) در ۴۹ رشته ورزشی در استان تهران جمع آوری شد. **یافته‌ها:** نتایج این تحقیق نشان داد شیوع مصرف مواد نیروزا در بین این ورزشکاران ۱۷/۱۲ درصد بود. همچنین ۱۲/۱۶ درصد از ورزشکاران عضو گروه نمونه (مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی) را تجربه کرده بودند. شیوع حداقل یک مورد از مواد ممنوعه (مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی) در بین زنان ورزشکار مصرف سیگار ۹/۶۸ درصد (۱۱/۴۱ درصد در بین مردان ورزشکار و ۷/۸۷ درصد در بین زنان ورزشکار)، شیوع مصرف مواد مخدر ۲/۴۸ درصد در بین مردان ورزشکار و ۱/۰۲ درصد در بین زنان ورزشکار، شیوع مصرف مواد روان‌گردن ۱/۷۴ درصد در بین مردان ورزشکار، ۰/۵۱ درصد در بین زنان ورزشکار استان تهران (۱۱/۴۱ درصد در بین زنان ورزشکار) و شیوع مصرف مواد نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران ۱۵/۲۹ (۷/۳۶ درصد در بین زنان ورزشکار و ۳/۸۸ درصد در بین مردان ورزشکار) بود. **نتیجه‌گیری:** نتایج این مطالعه نشان داد سوء مصرف مواد در بین ورزشکاران نوجوان و جوان استان تهران یک واقعیت انکار ناپذیر بوده و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشگیری در این خصوص بسیار ضروریست.

کلیدواژه‌ها: مواد نیروزا، روان‌گردن، مشروبات الکلی، استان تهران، ورزشکاران

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی به سفارش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است (مجرجی: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی)

۱. نویسنده مسئول: دانشیار، گروه یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران ایران. پست الکترونیک: ssrc.kashi@gmail.com

مقدمه

براساس گزارش تحقیقات متعدد مصرف مواد مختلف ممنوعه همچون مواد مخدر، روان‌گردان، مکمل‌ها و داروهای نیروزا که بدون تجویز پزشک مصرف می‌شوند، یک مشکل بزرگ در سراسر دنیا محسوب می‌شود و علاقه به مصرف این مواد در سطح بین الملل همچنان در حال افزایش بوده و در سال‌های اخیر مصرف این مواد در ورزشکاران به شکل چشمگیری مورد توجه محققان قرار گرفته است که با توجه به ماهیت سلامت بخش ورزش و خطرات ناشی از مصرف این مواد در ورزشکاران، توجه به این نکته می‌تواند هشدار دهنده باشد (الگویان، المواری، الشهري و الهجاج^۱، ۲۰۱۱؛ دوکتر^۲ و همکاران، ۲۰۲۰). بر اساس گزارش اگسترن^۳ و همکاران (۲۰۲۱) گرچه نرخ کلی سوء مصرف ممکن است در ورزشکاران نخه کمتر باشد، اما میزان شیوع برخی مواد در برخی رشته‌های ورزشی بسیار بالابوده و نیازمند توجه جدی دارد.

در حالی که جمعیت جهان در ابتدای سال ۲۰۲۱ و در حال حاضر بر اساس آمارهای مرکز سنجش جهانی^۴ بیش از هفت میلیارد و هشتصد میلیون نفر است، جمعیت افراد بین سینین ۱۵ تا ۶۴ سال که بیشتر مستعد مصرف مواد مخدر هستند نزدیک به ۵ میلیارد نفر می‌باشد. جمعیت افراد بین ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ای که در هر سال حداقل یک بار مواد مخدر مصرف می‌کنند برابر با ۲۰۸ میلیون نفر یا ۴٪ جمعیت کل جهان تخمین زده می‌شود و تعداد افرادی که در طول هر ماه یک بار از این مواد مصرف می‌کنند در همین سینین برابر با ۱۱۲ میلیون و یا ۲٪ جمعیت جهان است. همچنین تعداد افراد بین ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ی دنیا که معتاد به مواد مخدر هستند، ۲۶ میلیون نفر و یا ۰٪ جمعیت جهان است. سازمان سنجش جهانی گزارش می‌نماید که در هر روز بیش از ۱۰ میلیارد سیگار مصرف می‌شود، مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در هر روز بیش از سه میلیون و ششصد هزار نفر بوده و مرگ و میر ناشی از مصرف الکل نیز روزانه بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر است (مرکز سنجش جهانی، ۲۰۱۸). آمارهای سازمان ملل متحده نیز نشان می‌دهد در سال

۸۶

۸۶

۱۴۰
سال پانزدهم شماره ۶۲، زمستان
Vol. 15, No. 62, Winter 2022

1. Al Ghobain, Al Moamary, Al Shehri & Al-Hajjaj
2. Docter

3. Exner
4. Worldometers

۲۰۱۸ میزان مصرف این مواد ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۶۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان مواد مخدر استفاده کرده‌اند و بیش از ۳۵ میلیون نفر از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج می‌برند (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۲۰۲۰).

مرلین، اومالی، اسکولنبرگ، باچمن و جوهانستون^۱ (۲۰۰۴) شیوع مصرف مواد ممنوعه در افراد ۳۵ ساله در آمریکا را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تقریباً ۲۶٪ مردان و ۲۴٪ زنان سیگار کشیدن را در ۳۰ روز گذشته، ۳۲٪ مردان و ۱۳٪ زنان مصرف زیاد الکل را اخیراً، ۱۲٪ مردان و ۷٪ زنان مصرف ماری جوآنا را در ۳۰ روز گذشته، ۶٪ مردان و ۳٪ زنان مصرف کوکائین را در ۱۲ ماه گذشته و ۷٪ مردان و ۸٪ زنان مصرف داروهای بدون تجویز پزشک را در ۱۲ ماه گذشته گزارش کرده بودند. در یک مطالعه جدید تر نیز لیپاری و وان هورن^۲ در سال ۲۰۱۷ آمار افراد بالای ۱۸ سالی که اقدام به سوء مصرف مواد در آمریکا می‌نمایند را گزارش نمود. این محققان بیان داشتند تقریباً ۲۰٪ میلیون بزرگسال ۱۸ ساله یا بالاتر یک سال گذشته سوء مصرف مواد داشتند. از این بزرگسالان، ۱۶/۳ میلیون نفر دچار اختلال در مصرف الکل و ۶/۲ میلیون نفر نیز از نظر مصرف مواد مخدر بودند. تحقیقات دیگری نیز به بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردن عمدتاً در نوجوانان و جوانان پرداخته‌اند. در یکی از مطالعات داخل کشور، شیخ و کاشی (۱۳۹۲) به بررسی مصرف مواد مخدر و روان‌گردن در بین دانش‌آموzan ایرانی پرداختند. از ۲۴۰۰ دانش‌آموز ۱۵۷ نفر (۶/۵٪) درصد) مصرف حداقل یک بار مواد مخدر و یا روان‌گردن را گزارش نمودند. شیوع مواد مخدر و روان‌گردن در دانش‌آموzan دختر این تحقیق برابر با ۳/۹٪ و در دانش‌آموzan پسر عضو نمونه‌ی این پژوهش برابر با ۱۶/۹٪ بود.

همچنین سوء مصرف مواد نیروزا نیز در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. این نتایج در کشور ایران از سال ۱۳۸۳ تا کنون، نشان‌دهنده‌ی شیوع بالای مصرف

1. United Nations Office on Drugs and Crime

3. Merline, O'Malley, Schulenberg, Bachman, & Johnston
3. Lipari & Van Horn

این مواد و آگاهی بسیار کم مصرف کنندگان مواد نیروزا درباره عوارض جانبی مصرف این مواد می‌باشد. بر اساس این نتایج شیوع مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران رشته بدنسازی و پرورش اندام کشور ۹٪ (کاشی، کارگر فرد، مولوی و سرلک، ۱۳۸۴) و در بین دانشآموزان دیبرستانی استان لرستان ۹٪ می‌باشد (کاشی و سرلک، ۱۳۸۶). شیخ و کاشی (۱۳۹۲) در یک طرح تحقیقی ملی به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران با بررسی ۲۴۰۰ دانشآموز ایرانی گزارش نمودند که ۵/۷ درصد از پسران عضو نمونه و ۰/۸ درصد از دختران دانشآموز ایرانی از مواد نیروزا استفاده کرده‌اند. کاشی و سرلک در یک پیمایش ملی به سفارش وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۹ شیوع مصرف مواد نیروزا را در ورزشکاران ایرانی ۱۵/۴۶۵ درصد گزارش نمودند.

مجموع تحقیقات فوق نشان‌دهنده این موضوع است که شیوع مصرف مواد نیروزا، مواد مخدر و روان‌گردان و مشروبات الکلی در سطح وسیعی در بین نوجوانان و جوانان در سطح دنیا و بالاخص در کشور ما شایع است. مطالعات ذکر شده فوق نشان دادند که یکی از اقشاری که به شکل جدی در معرض این خطرات است اقشار ورزشکار می‌باشند. لذا با توجه به خطرات جدی تهدید کننده این مواد برای این جوانان و نوجوانان که از آینده‌سازان این کشور می‌باشند در این پژوهش به بررسی وضعیت و الگوهای سوء مصرف مواد نیروزا، مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در میان جوانان ورزشکار استان تهران پرداخته شه است تا پس از مشخص شدن میزان شیوع، با شناختی بهتر نقاط ضعف و قوت موجود را شناسایی کرده و پیشنهادات و راهکارهای اساسی را در جهت بهبود و رفع موانع و مشکلات ارائه شود. همچنین با قرار دادن این اطلاعات در اختیار مسئولین مربوطه به ارتقاء دانش و آگاهی آنها در زمینه‌ی پیشگیری از مصرف و آسیب این مواد کمک نماید. بر همین اساس این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بود که میزان شیوع مصرف مواد نیروزا، مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در بین زنان و مردان ورزشکار استان تهران در رشته‌های ورزشی مختلف به چه میزان می‌باشد.

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران استان تهران که حداقل دارای ۶ ماه سابقه فعالیت ورزشی بودند تشکیل می‌داد. از بین این افراد با روش نمونه‌گیری خوش‌های تعداد ۸۰۶ پرسشنامه از حدوداً ۵۰ رشته ورزشی در این استان جمع‌آوری شد. اطلاعات این ورزشکاران در بخش نتایج مقاله به تفصیل بیشتری ارائه می‌شود. شیوه جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق به این صورت بود که لینک تکمیل اطلاعات از سوی محقق برای مسئولین حوزه ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های مختلف استان تهران ارسال شد و این افراد این لینک را برای مسئولین هیات‌های ورزشی، مریبان و باشگاهداران ارسال می‌کردند و سپس این افراد لینک را در اختیار ورزشکاران فعال خوبیش قرار می‌دادند. با این شیوه و با کنترل روزانه و برخبط اطلاعات جمع‌آوری شده، محقق سعی نمود تا مناسب با جامعه ورزشکاران این استان، نمونه‌گیری مناسبی در رشته‌های ورزشی مختلف و سطوح مختلف ورزشکاران (ورزشکاران با سطوح قهرمانی مختلف) انجام نماید. با توجه به اینکه اعتراف به مسائلی که از لحاظ اجتماعی هنجار نیستند، جمع‌آوری اطلاعات به صورت فردی مشکل بوده و افراد به راحتی اعتراف به این مسائل نمی‌کنند، لذا اطلاعات لازم از طریق فضای مجازی و محترمانه و بدون افشا شدن نام و نشانی افراد جمع‌آوری شد (با استفاده از گوگل فرم و در قالب پرسشنامه بدون نام). سپس اطلاعات جمع‌آوری شده کدگزاری شده، در نرم افزار SPSS وارد و مورد تحلیل قرار گرفتند.

ابزار

ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه‌ی خود گزارش‌دهی، بدون نام و محقق ساخته‌ای بود که جهت اندازه‌گیری میزان شیوع مصرف مواد نیروزاء، مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی طراحی شده بود. نسخه اولیه این پرسشنامه در طرح تحقیقی به سفارش پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور (کاشی و سرلک، ۱۳۸۵) استاندارد شد. اعتبار آن نیز توسط آماره آزمون آلفای کرونباخ ۰/۷۱ بدست آمد و روایی آن نیز مورد تایید متخصصین قرار گرفت. البته

محقق در تدوین فرم نهایی پرسشنامه از اطلاعات پرسشنامه موران، گورین، کیربای و مک ایتایر^۱ (۲۰۰۸) نیز استفاده نمود. البته برای کسب اطمینان از فهم صحیح اطلاعات و برداشت یکسان شرکت کنندگان در پیمایش سوالات توصیفی مورد استفاده در شکل نهایی پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتی آلفای کرونباخ نیز سنجیده شد که این میزان برای سوالات پرسشنامه ۰/۷۹ بود که مورد تایید بوده و نشان‌دهنده پایایی درونی سوالات پرسشنامه تحقیق است.

یافته‌ها

تصویف خصوصیات اعضاء گروه نمونه تحقیق: در این پژوهش تعداد ۸۰۶ پرسشنامه از ۳۹۴ زن ورزشکار (۴۸/۹ درصد اعضاء گروه نمونه تحقیق) و ۴۱۲ مرد ورزشکار (۵۱/۱ درصد از اعضاء گروه نمونه تحقیق) از ۵۰ رشته ورزشی در این استان جمع‌آوری شد. این اعضاء در کل دارای میانگین سن $۳۱/۴۸ \pm ۱۰/۵۳$ سال بودند. البته سن مردان ورزشکار $۳۱/۹۲ \pm ۱۱/۳۹$ سال و زنان ورزشکار برابر با $۳۱/۹۲ \pm ۱۱/۳۹$ سال بود (۶۸ درصد ورزشکاران شرکت کننده در این پیمایش در دامنه سنی ۲۰-۴۲ سال بودند). همچنین بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان داد شرکت کنندگان در این پیمایش به صورت میانگین دارای $۹/۹۳ \pm ۸/۶۷$ سال سابقه فعالیت ورزشی بودند. البته سابقه فعالیت ورزشی در مردان ورزشکار $۹/۸۳ \pm ۱۱/۵۹$ سال و در زنان ورزشکار $۸/۱۹ \pm ۶/۸۵$ سال بود. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این تحقیق مشخص شد که بیشترین تعداد ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق به ترتیب در رشته‌های پرورش اندام و بدنسازی (۸۹٪ ورزشکار)، فوتbal (۴۲٪ ورزشکار)، بدمنیتون (۴۱٪ ورزشکار)، شنا (۳۶٪ ورزشکار)، آمادگی جسمانی (۳۱٪ ورزشکار) و تیراندازی (۳۰٪ ورزشکار) بودند. البته بیشترین تعداد ورزشکاران در زنان ورزشکار در رشته‌های پرورش اندام و بدنسازی (۴۲٪ ورزشکار)، بدمنیتون (۳۱٪ ورزشکار)، ژیمناستیک (۲۴٪ ورزشکار)، آمادگی جسمانی (۲۲٪ ورزشکار) و شنا (بودند) مشغول فعالیت بودند. در مردان ورزشکار نیز بیشترین تعداد ورزشکاران متعلق به رشته‌های پرورش اندام و بدنسازی (۵۶٪ ورزشکار)، فوتbal (۳۷٪ ورزشکار)، والیبال (۲۸٪ ورزشکار)،

۹۰

90

کاراته (۲۴ ورزشکار) و کشتی (۲۰ ورزشکار) بود. علاوه بر بررسی سوابق فعالیت ورزشی مشخص شد ۴۵۴ ورزشکار دارای سابقه قهرمانی ورزشی هستند که از این تعداد، ۹۱ ورزشکار دارای سابقه قهرمانی در سطح شهر، ۱۲۷ ورزشکار دارای سابقه قهرمانی در سطح استان، ۱۷۳ نفر دارای سابقه قهرمانی در سطح ملی یا کشوری بوده و ۶۱ ورزشکار نیز دارای سابقه قهرمانی در سطح بین الملل بودند که نشان‌دهنده یک جمعیت نمونه بسیار متنوع از رشته‌های مختلف و سطوح ورزشکاری متنوع (قابل تعمیم با ورزشکاران کل استان) در سطح این استان می‌باشد. این اطلاعات در جدول ۱ گزارش شده است.

جدول ۱: تعداد ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی، میانگین سن ورزشکاران هر رشته (به سال)

میانگین مدت سابقه فعالیت ورزشی ایشان (به سال)

	رشته ورزشی	تعداد ورزشکار					میانگین سن	میانگین مدت سابقه ورزشی
		M	STD	M	STD	کل		
۹۱	فوتبال	۱۳/۴۴۰	۱۰/۱۹۱	۳۱/۵۲۳	۱۳/۸۴۹	۴۲	۳۷	۵
	بوکس	۱۴/۷۶۹	۱۰/۷۶۳	۳۰/۲۳۰	۹/۵۳۲	۱۳	۹	۴
	بسکتبال	۱۰/۴۵۰	۸/۸۱۶	۳۱/۰۵۰	۱۴/۴۵۳	۲۰	۱۲	۸
	تیراندازی با تیروکمان	۹/۲۰۰	۱/۰۹۵	۳۷/۴۰۰	۵/۶۸۳	۵	۰	۵
	بدمیتون	۱۱/۳۸۷	۶/۴۳۴	۳۶/۱۷۰	۹/۵۱۲	۴۱	۱۰	۳۱
۹۱	تنیس روی میز	۱۵	۱۲/۹۷۸	۳۳/۳۰۰	۱۰/۸۸۳	۱۰	۶	۴
	تنیس	۷/۴۶۶	۹/۰۷۷	۲۹/۰۸۳	۱۲/۳۸۳	۱۲	۶	۶
	وزنه برداری	۷	۳/۸۷۷	۲۸/۷۱۴	۳/۹۰۳	۷	۶	۱
	سوارکاری	۲۵	۰/۰۰۰	۴۴	۰/۰۰۰	۲	۰	۲
	گلف	۱۵	۰/۰۰۰	۵۲	۰/۰۰۰	۱	۰	۱
	جودو	۱۳/۵۷۱	۱۰/۶۵۳	۳۳/۸۵۷	۹/۲۶۴	۱۴	۱۳	۱
	قایقرانی	۷/۸۰۰	۳/۸۳۴	۲۹	۳/۳۹۱	۵	۴	۱
	ششمیزبازی	۱۵/۲۵۰	۵/۵۰۰	۳۲/۵۰۰	۳	۴	۲	۲
	هاکی	۷/۵۰۰	۷/۷۷۸	۴۹/۵۰۰	۳۸/۸۹۰	۲	۱	۱
	تیراندازی	۸/۲۰۰	۵/۸۲۵	۳۱/۱۶۶	۱۰/۸۹۴	۳۰	۱۱	۱۹
	تکواندو	۱۰/۱۲۵	۹/۸۰۱	۲۷/۷۸۵	۱۵/۷۲۲	۲۸	۱۶	۱۲
	دوچرخه سواری	۸/۵۸۳	۴/۱۶۶	۳۲/۹۱۶	۷/۲۵۴	۱۲	۸	۴
	هندبال	۶/۰۶۸	۵/۴۹۰	۱۹/۲۷۲	۱۱/۱۱۵	۲۲	۴	۱۸
	کاراته	۱۹	۱۰/۷۰۲	۳۳/۲۷۵	۱۰/۲۱۵	۲۹	۲۴	۵
	اسکیت بورد	۷	۶/۷۰۸	۲۶/۶۰۰	۶/۲۲۸	۵	۲	۳


جدول ۱: تعداد ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی، میانگین سن ورزشکاران هر رشته (به سال) و میانگین مدت سابقه فعالیت ورزشی ایشان (به سال)

میانگین سالقه ورزشی		میانگین سن		تعداد ورزشکار			رشته ورزشی	
M	STD	M	STD	کل	مرد	زن		
۱۵	۱۰/۱۹۸	۴۰/۰۶۶	۷/۲۴۸	۱۵	۸	۷	کوهنوردی	۲۱
۱۱/۴۷۱	۱۰/۲۶۵	۳۰/۷۷۸	۱۱/۲۷۹	۴۵	۲۸	۱۷	والیال سالنی	۲۲
۱۲	۷/۸۶۷	۳۵/۴۰۰	۱۰/۰۶۵	۲۰	۲۰	۰	کشتی	۲۳
۱۱/۱۰۴	۶/۹۲۳	۲۷/۹۵۸	۶/۴۹۷	۲۴	۰	۲۴	ژیمناستیک	۲۴
۹/۷۵۵	۸/۴۷۷	۲۳/۳۳۳	۱۱/۳۵۹	۳۶	۱۶	۲۰	شنا	۲۵
۶/۴۹۰	۴/۲۲۹	۲۸/۹۰۹	۷/۵۱۴	۲۲	۱۱	۱۱	فوتسال	۲۶
۱۶/۷۵۰	۸/۳۲۴	۲۵/۳۳۳	۵/۷۱۰	۱۲	۱۱	۱	کرمنگ فو	۲۷
۱۳/۵۸۳	۱۳/۷۰۵	۳۷/۱۶۶	۷/۴۶۷	۶	۴	۲	شترنج	۲۸
۱۱/۴۰۰	۶/۷۸۵	۳۱/۷۰۰	۲/۱۶۲	۱۰	۴	۶	ووشو	۲۹
۶/۹۵۵	۷/۸۰۱	۳۱/۰۸۱	۸/۹۰۸	۹۸	۵۶	۴۲	پرورش اندام و بدنسازی	۳۰
۱۰/۱۲۹	۹/۰۶۴	۳۲/۷۰۹	۷/۹۸۸	۳۱	۹	۲۲	آمادگی جسمانی	۳۱
۴/۰۳۸	۲/۸۰۲	۲۶/۸۴۶	۹/۲۵۴	۱۳	۰	۱۳	ایروبیک	۳۲
۷/۳۳۳	۶/۰۳۹	۲۶/۱۶۶	۸/۲۱۹	۱۸	۱۱	۷	دو و میدانی	۳۳
۶	۴/۴۱۱	۴۱	۱۰/۳۴۴	۱۳	۰	۱۳	پلاتس	۳۴
۳/۲۸۱	۱/۹۲۳	۳۰/۱۸۷	۸/۶۸۸	۱۶	۲	۱۴	trx	۳۵
۸/۰۵۵	۲/۱۲۷	۲۸/۷۲۲	۵/۹۸۸	۱۸	۹	۹	ورزشهای رزمی	۳۶
۹/۳۸۰	۱۲/۶۲۳	۳۵/۱۹۰	۱۱/۹۸۵	۲۱	۶	۱۵	ورزش‌های همگانی	۳۷
۸/۴۵۴	۷/۴۴۸	۲۹	۱۱/۶۸۷	۱۱	۷	۴	رشته‌های بومی و محلی	۳۸
۶/۶۵۰	۴/۹۶۶	۳۲/۹۰۰	۹/۲۹۰	۱۰	۴	۶	ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای	۳۹
۳/۴۰۰	۱/۱۴۰	۳۲/۶۰۰	۱/۸۱۶	۵	۱	۴	صخره نوردی	۴۰
۷	۱/۴۱۴	۲۲	۰	۲	۱	۱	اسکی	۴۱
۹/۹۱۶	۸/۱۴۰	۳۲/۸۳۳	۳/۹۹۶	۱۲	۶	۶	کیک بو کسینگ	۴۲
۱۰	.	۳۵	۰.	۱	۱	۰	موتورسواری و اتومبیل رانی	۴۳
۱۱/۳۱۸	۹/۲۹۵	۳۴	۱۴/۴۰۱	۱۱	۹	۲	اسکواش	۴۴
۹	۴/۶۲۶	۲۸/۵۴۵	۴/۳۶۷	۱۱	۶	۵	پارکور	۴۵
۱۱/۵۰۰	۷/۴۴۹	۳۴/۸۳۳	۸/۱۵۸	۶	۶	۰	دارت	۴۶
۳۰	.	۳۹	۰	۱	۱	۰	کبدی	۴۷
۲/۷۵۰	۱/۵۰۰	۳۵	۷/۰۷۱	۴	۲	۲	کراس فیت	۴۸
۴/۳۶۰	۴/۷۴۶	۲۶/۷۰۰	۷/۱۰۳	۱۰	۲	۸	یوگا	۴۹
۹/۹۳۳	۸/۶۶۹	۳۱/۴۷۷	۱۰/۵۲۶	۸۰۶	۴۱۲	۳۹۴	کل	

بررسی عوامل محیطی موثر در مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران: جهت کسب اطلاعات در زمینه در کم عوامل محیطی موثر بر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی در بین ورزشکاران استان تهران چند سوال دو گزینه‌ای در پرسشنامه تحقیق در این خصوص از ورزشکاران پرسیده شد که در ادامه نتایج بررسی‌های انجام شده در این بخش توضیح داده می‌شود. تحلیل نتایج تحقیق نشان داد از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در این تحقیق تعداد ۲۹۳ ورزشکار (۳۶/۳۵) درصد از ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق (اعلام کردند که تا کنون مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی به آن‌ها پیشنهاد شده است. از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در این پیمایش ۴۰۲ ورزشکار (۴۹/۸۷) درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که تا کنون شاهد مصرف مواد ممنوعه فوق توسط دوستان و آشنايان خويش بوده‌اند. تحلیل نتایج تحقیق نشان داد از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در اين تحقیق ۳۷۸ ورزشکار (۴۶/۸۹) درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که اگر قصد مصرف مواد نیروزا را داشته باشند، امکان تهیه این مواد برایشان ميسراست و در سوالی دیگر نيز مشخص شد از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در این تحقیق ۴۶۴ ورزشکار (۵۷/۵۶) درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که تا کنون شاهد عوارض جانبی بد مصرف اين مواد در ورزشکاران بوده‌اند.

شيوع مصرف مواد نیروزا در زنان و مردان ورزشکار استان تهران: يكى از مقدمات مصرف مواد ممنوعه شروع به مصرف کردن مواد نیروزا است. لذا مصرف مواد نیروزا نيز در ابتدای اين تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده در نمودار ۱ مشخص است ۴۹ زن ورزشکار (۱۲/۴۳) درصد از زنان ورزشکار و ۸۹ مرد ورزشکار (۲۱/۶۰) درصد از مردان ورزشکار) تا کنون اقدام به مصرف مواد نیروزا کرده بودند. در كل شيوع مصرف مواد نیروزا در بين اين ورزشکاران نيز ۱۷/۱۲ درصد (مصرف اين مواد توسط ۱۳۸ ورزشکار) بود.

شیوع مصرف مواد نیروزا در زنان و مردان ورزشکار استان تهران



نمودار ۱: شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران استان تهران


بر اساس جدول ۲ تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین میزان شیوع مصرف مواد نیروزا در بین این ورزشکاران در ابتدا شامل مکمل‌های ویتامینی، سپس مکمل‌های پروتئینی، مکمل‌های مواد معدنی، مکمل‌های اسید آمینه‌ای، کراتین، داروهای کاهش وزن، مکمل‌های کربوهیدراتی، داروهای کاهش وزن و استروئیدهای آنابولیک بود.

جدول ۲: درصد میزان شیوع هر یک از مواد نیروزا در ورزشکاران استان تهران

نام مواد	مردان ورزشکار	زنان ورزشکار	مردان استان تهران	زنان استان تهران
کربوهیدرات	۹/۶۷۷	۱۱/۱۶۶	۰/۶۲۰	۰/۶۹۹
مکمل ویتامین	۶/۰۷۹	۶/۴۵۱	۲/۳۵۷	۲/۷۲۹
مکمل پروتئین	۷/۰۷۱	۹/۱۸۱	۱۰/۲۹۷	۰/۶۲۰
مکمل اسید آمینه‌ای	۲/۶۰۵	۲/۳۵۷	۰/۶۲۰	۰/۶۹۹
کراتین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷
داروهای کاهش وزن	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
استروئیدها	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
آنابولیک	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
دوپامین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
تیامین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
فیتیل	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
کافئین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
کافکائین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
کافئین و کافکائین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷
کافکائین و کافئین	۰/۶۷۷	۰/۶۹۹	۰/۶۷۷	۰/۶۷۷

شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران: بر اساس اطلاعات ارائه شده در نمودار ۲ و جدول ۳ مشخص است که ۷۰۸ ورزشکار تاکنون هیچ ماده مخدر، روان‌گردان و یا مشروب الکلی را مصرف نکرده و ۹۸ ورزشکار (۶۸ مرد ورزشکار و ۳۰ زن ورزشکار) مصرف این مواد را تجربه کرده بودند. با این حساب میزان شیوع مصرف مواد ممنوعه مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در

ورزشکاران استان تهران ۱۲/۱۵ درصد است که این شیوع در مردان ورزشکار ۱۶/۵۰ درصد و در زنان ورزشکار استان تهران ۷/۶۱ درصد است. به صورت تفکیک شده این اطلاعات در جدول فوق قابل مشاهده است.




نمودار ۲: مصرف سیگار، مواد مخدر، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در زنان و مردان ورزشکار استان تهران

جدول ۳: میزان شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، مواد روغنگردان و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران

		شیوع در مردان ورزشکار		شیوع در زنان ورزشکار		شیوع کلی در ورزشکاران	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	شیوع مصرف سیگار
پژوهش شماره ۹۵، زمستان ۱۴۰۰، Vol. 15, No 62, Winter 2022	۷۸	۹/۶۷۷	۳۱	۷/۸۶۸	۴۷	۱۱/۴۰۷	شیوع مصرف سیگار
	۲۰	۲/۴۸۱	۴	۱/۱۰۱۵	۱۶	۳/۸۸۳	شیوع مصرف مواد مخدر
	۱۴	۱/۷۴۰	۲	۰/۵۰۷	۱۲	۲/۹۱۲	شیوع مصرف مواد روان‌گردن
	۹۲	۱۱/۴۱۴	۲۹	۷/۳۶۰	۶۳	۱۵/۲۹۱	شیوع مصرف نوشیدنی‌های الکلی

محقق در سوالی دیگر از این افراد خواست تا انواع مواد مختلف مواد مورد استفاده خویش را گزارش نمایند. این ورزشکاران مصرف موادی همچون آبجو، ابسولوت، تریاک، هنسی، عرق، شراب، اکس، کراک، مشروب‌های الکلی، حشیش، گل، عرق (عرق

کشمش)، کوکایین، شیره، ماری‌جوانا، ماشروم، ماری‌جوانا، ووتکا، ویسکی را در پرسشنامه تحقیق ذکر نموده و گزارش دادند از این مواد استفاده می‌نمایند. میانگین سن شروع به مصرف مواد مخدو روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران



نمودار ۳ میانگین سن شروع سوء مصرف مواد مخدو، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران


سن شروع سوء مصرف مواد مخدو، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران: همانطور که نمودار ۳ نشان می‌دهد میانگین سن شروع سوء مصرف مواد مخدو، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران $18/87 \pm 3/58$ سال می‌باشد. این میانگین در زنان ورزشکار برابر با $19/88 \pm 3/86$ و در مردان ورزشکار $18/32 \pm 18/32$ است. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معناداری بین سن سوء مصرف مواد مخدو، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی بین زنان و مردان ورزشکار وجود دارد و زنان ورزشکار به صورت معناداری در سن بالاتری اقدام به مصرف این مواد می‌نمایند ($dr=96$)

$$(P=0.041, T=2.075)$$

میزان اطلاعات علمی در خصوص مصرف مواد در ورزش: در یک سوال از شرکت کنندگان در این تحقیق سوال شد آیا برای کسب اطلاعات علمی در خصوص مصرف مواد در ورزش تلاشی را داشته‌اند؟ ۳۹۹ نفر بیان داشته‌اند به (۲۳۶ مرد ورزشکار و ۱۶۳ زن ورزشکار) و گزارش نمودند تا کنون برای کسب اطلاعات علمی تلاش کرده‌اند و

۴۰۷ نفر نیز گزارش دادند که تلاشی را تا کنون در این زمینه انجام نداده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این تحقیق مشخص است که بیشترین منبع این افراد جستجو در اینترنت است. نمودار ۴ خود گزارش‌دهی سطح آگاهی این ورزشکاران در زمینه مصرف مواد در ورزش است که خود آن‌ها نمره‌ای از ۱-۱۰ را برای اطلاعات خویش نمره‌دهی کرده‌اند. همانطور که این نمودار نشان می‌دهد آگاهی این افراد نمره‌ای $2/71 \pm 4/77$ را به خود اختصاص می‌دهد و خود این افراد به صورت میانگین نمره‌ای کمتر از حد متوسط به اطلاعاتشان در خصوص مصرف مواد داده‌اند و لزوم توسعه آگاهی و دانش ایشان به خوبی احساس می‌شود.

خود گزارش‌دهی آگاهی ورزشکاران استان فومن در خصوص مصرف مواد در ورزش



نمودار ۴: میزان آگاهی ورزشکاران عضو گروه نمونه تحقیق در خصوص مصرف مواد در ورزش

بحث و نتیجه‌گیری

عوامل محیطی موثر بر مصرف مواد: تحلیل نتایج تحقیق نشان داد از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در این تحقیق تعداد ۲۹۳ ورزشکار ($36/35$ درصد از ورزشکاران شرکت کننده در این تحقیق) اعلام کردند که تا کنون مصرف مواد مخدر، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی به آن‌ها پیشنهاد شده است. این نتایج نشان داد که مردان ورزشکار پیشنهادات بیشتری را برای مصرف مواد ممنوعه داشته‌اند. همچنین ۴۰۲ ورزشکار ($49/87$)

در صد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که تا کنون شاهد مصرف مواد ممنوعه توسط دوستان و آشنايان خويش بوده و البته ميزان مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و نوشيدني‌هاي الکلی در دوستان و آشنايان مردان ورزشكار شرکت کننده در اين پيمایيش بيشتر از زنان ورزشكار بود. در بخشی ديگر نيز در اين تحقیق مشخص شد ۳۷۸ ورزشكار (۴۶/۸۹) در صد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که اگر قصد مصرف مواد نیروزا را داشته باشند، امکان تهیه این مواد برایشان میسر است باز هم امکان تهیه مواد در مردان ورزشكار بيشتر از زنان ورزشكار بود. همچنين ۴۶۴ ورزشكار (۵۷/۵۶) در صد از شرکت کنندگان در این تحقیق) اعلام کردند که تا کنون شاهد عوارض جانبي بد مصرف اين مواد در ورزشكاران بوده‌اند و مشاهده عوارض جانبي مصرف مواد نیروزا در مردان ورزشكار شرکت کننده در اين پيمایيش بيشتر از زنان ورزشكار بود. اين آمارها نشان می‌دهد تا چه حد، جو مصرف اين مواد در بين ورزشكاران استان تهران شایع است و با توجه به اثرگذاري اين متغيرها در مصرف مواد مخدر و روان‌گردان می‌توان بيم آن را داشت تا عده بيشتری در معرض خطر مصرف اين مواد باشند. برطبق آخرین آمار و اطلاعات مرکز ملي اطلاعات و آمار سوء مصرف مواد^۱ در سال ۲۰۲۰ گزارش می‌نماید که ۸۶ درصد از جوانان فردی را می‌شناسند که در طول روزهای مدرسه اقدام به مصرف مواد یا کشیدن سیگار می‌کنند، ۵۰ درصد اين افراد حداقل يكبار از مواد ممنوعه در طول زندگی خويش استفاده کرده بودند و ۴۳ درصد از ايشان در حال مصرف مواد ممنوعه و غير قانوني بودند. مقایسه نتایج مطالعه حاضر با اين مطالعه نيز نشان‌دهنده همسویی نتایج اين تحقیق با تحقیقات بين‌المللی و بيانگر لزوم توجه به مسئله فرهنگ‌سازی در محیط‌های عمومی که جوانان و نوجوانان کشور و بالاخص ورزشكاران با آن ارتباط دارند، است.

شيوع مصرف مواد نیروزا در زنان و مردان ورزشكار استان تهران: مصرف مواد در ورزشكاران يك پديده‌اي است که از صدها سال قبل تا کنون توجه محققين و دانشمندان اين حوزه را به خويش اختصاص داده است. در ابتدا مسائلی همچون دوپينگ و منع فعالیت ورزشكاران مطرح بود. موضوع بعدی که توجه دانشمندان را به خود جلب نمود

عوارض جانبی مصرف انواع مختلف مواد نیروزا بود. حالا یک گام موضوع پیچیده‌تر شده است و نتایج مطالعات مختلف در این زمینه نشان داده‌اند ممکن است مصرف مواد نیروزا مقدمه‌ای برای مصرف داروهایی ممنوعه در ورزشکاران باشد و به همین دلیل این دو پدیده با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند. لذا محققین نیز در این تحقیق، قبل از سنجش مصرف مواد مخدر، روان‌گردن و مشروبات الکلی در خصوص مصرف مواد نیروزا از ورزشکاران سوال کردند. سوء مصرف مواد نیروزا در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. مرور این نتایج در کشور ایران از سال ۱۳۸۳ تا کنون، نشان‌دهنده‌ی شیوع بالای مصرف این مواد و آگاهی بسیار کم مصرف کنندگان مواد نیروزا درباره‌ی عوارض جانبی مصرف این مواد می‌باشد (کاشی، کارگر فرد، مولوی و سرلک،^۱ کاشی،^۲ نقیبی، شریعت زاده و آقابابا،^۳ کاشی و سرلک،^۴ ۱۳۹۹). تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد ۴۹ زن ورزشکار (۱۲/۴۳ درصد از زنان ورزشکار) و ۸۹ مرد ورزشکار (۲۱/۶۰ درصد از مردان ورزشکار) تا کنون اقدام به مصرف مواد نیروزا کرده بودند. در کل شیوع مصرف مواد نیروزا در بین این ورزشکاران نیز ۱۷/۱۲ درصد (صرف این مواد توسط ۱۳۸ ورزشکار) بود. مقدار شیوع مصرف مواد در این تحقیق، با فراتحلیل کاشی و همکاران در سال ۱۳۹۶ همخوان بود و در دامنه‌ای نسبتاً برابر مصرف مواد نیروزا در این تحقیق گزارش شده بود. البته نتایج پیمایش ملی مصرف مواد نیروزا در سال ۱۳۹۹ (کاشی و سرلک،^۵ ۱۳۹۹) نشان داد شیوع مصرف این مواد به صورت میانگین در سطح کشور ۱۵/۴۶ درصد است و میزان شیوع این مواد در استان تهران بالاتر از میانگین کشوری است.

تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که مصرف برخی از مواد نیروزا همچون استروئیدهای آنabolیک علاوه بر عوارض جانبی خطرناکی که برای سلامتی فرد دارند می‌توانند به عنوان زمینه‌ساز یا مقدمه‌ای برای مصرف مواد دیگری همچون مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی باشد (راندل، گرگ و رو دریگو^۱، ۲۰۰۲؛ نیلسون، بیگی، مارکلند و فریدلун^۲، ۲۰۰۱؛ کانایاما، پوپ کوهان و هودسون^۳، ۲۰۰۳). کاشی و سرلک (۱۳۸۶)^۴ نیز در تحقیق خود در

1. Randall, Grage & Rodrigo
2. Nilsson, Baigi, Marklund &
Fridlund

3. Kanayama, Pope, Cohane, and
Hudson:

استان لرستان متوجه شدند که مصرف مواد نیروزا می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای مصرف مواد مخدر و روان‌گردان باشد. احتمالاً علت این موضوع این است که افراد مصرف کننده‌ی این مواد عوامل مستعد سوء مصرف را داشته، در محیط مشوق این مواد قرار دارند و از طرفی قبح سوء مصرف مواد در آنها شکسته شده و با جرات بیشتری اقدام به مصرف مواد ممنوعه‌ی دیگر می‌کنند. لذا با توجه به شیوع نسبتاً بالای مصرف مواد نیروزا توسط جوانان و نوجوانان ورزشکار استان تهران می‌توان یعنی آن را داشت که در آینده شاهد مصرف بیشتر مواد ممنوعه توسط ورزشکاران ایرانی و بالاخص استان تهران باشیم.

شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران: مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در کشور ما غیرقانونی و خلاف عرف و هنجار اجتماعی است. محققین مختلفی در کشور اقدام به بررسی مصرف این مواد نموده و در سال‌های مختلف مصرف این مواد را در جوامع مختلف گزارش داده‌اند. به جرات می‌توان گفت به سختی می‌توان عدد مشخصی را برای شیوع مصرف این مواد پیدا کرد. چرا که مصرف آن در نمونه‌های مختلف هر جامعه دارای تفاوت بارزی با یکدیگر است و در هر زمان و مکان افراد مختلف شیوع متفاوتی را گزارش داده‌اند. به عنوان مثال در یک پیمایش شیوع مصرف این مواد در دانشجویان دو دانشگاه در شیراز در یک بازه زمانی یکسان مورد مقایسه قرار گرفت. اشرافی حافظ و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف مواد روان‌گردان در دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز پرداختند. این محققین ۶۴۰ دانشجو را به روش نمونه‌گیری خوش‌های موربد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد شیوع مصرف مواد روان‌گردان در دانشجویان دانشگاه‌های شیراز ۹/۲ درصد و در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰/۸ درصد بود. دانشجویان شیراز در مقایسه با دانشجویان علوم پزشکی شیراز دارای مصرف مشروبات الکلی (۱۷/۷) در مقابل (۹/۴)، مواد مخدر (۹/۸ در برابر ۳/۳) و سیگار (۲۱/۵ در برابر ۱۷/۵) متفاوتی بودند.

۱۰۰
100

۱۴۰.
Vol. 15, No. 62, Winter 2022
سال پانزدهم شماره ۶۲، زمستان

حیدری و همکاران نیز در سال ۲۰۱۶ در یک مطالعه تحقیقی بر روی موتورسواران شیرازی نشان دادند ۱۵/۵ درصد از این افراد حداقل دو ساعت قبل از رانندگی از این مواد استفاده کرده بودند. شیوع مصرف الكل در این افراد ۲۰/۳ درصد و حشیش ۳۶/۷ درصد بود. ۲۵/۴ درصد این افراد نیز لاقل یک ماده مخدر را مصرف کرده بودند. نحوی زاده و همکاران (۲۰۱۴) در یک مطالعه تحقیقی مصرف مواد ممنوعه در دانشآموزان دبیرستانی را مرور نظاممند کردند. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین شیوع مصرف مواد مخدر مربوط به سیگار و قلیان است و پس از آن الكل، تریاک، اکستازی، حشیش و هروئین در بین افراد مصرف می‌شود. احمدی، نقشواریان و افشاری در سال ۲۰۱۱ در یک مطالعه تحقیقی اقدام به ارزیابی شیوع سوء مصرف مواد افیونی در نمونه‌ای از جمعیت مرد مراجعه کننده آزمایش ادرار ازدواج در شیراز نمودند. در این تحقیق نمونه‌ای متشكل از ۱۲۱۹ نفر (۱۶ سال به بالا) که به عنوان آزمایش اجباری ادرار برای آزمایش اجباری قبل از ازواج در شیراز در سال ۲۰۰۵ ارجاع شده بودند، در این مطالعه وارد شدند. نتایج این تحقیق نشان داد حداقل ۱/۸۰ درصد مردان مراجعه کننده به آزمایش اجباری ادرار از مواد مخدر استفاده کرده‌اند. قویدل و همکاران (۱۳۹۱) در یک مطالعه تحقیقی به بررسی شیوع مصرف مواد (سیگار، مواد مخدر، الكل، مواد روان‌گردان) و عوامل مرتبط با آن در دانشآموزان سوم دبیرستان شهرستان نظر آباد در سال‌های ۸۶ و ۸۷ پرداختند. در این مطالعه تحقیقی مشخص شد ۲۴/۵ درصد از این افراد حداقل برای یک بار از این مواد استفاده کرده‌اند. محمد خانی در سال ۱۳۹۰ در یک مطالعه تحقیقی به بررسی شیوع مصرف سیگار، مشروبات الكلی و مواد روان‌گردان در نوجوانان ایرانی پرداخت. در این پژوهش ۲۵۳۸ نفر از دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه از ۱۰ استان کشور با روش نمونه‌گیری خوش‌های انتخاب شده و نتایج این تحقیق نشان داد در مجموع ۱۸/۸ درصد دانشآموزان (۷/۵ درصد دختران و ۲۹/۸ درصد پسران) ۱۳-۱۸ ساله گزارش نمودند که حداقل یک بار در طول عمر خود یک نوع مواد شامل الكل، سیگار و سایر مواد غیر قانونی را مصرف کرده‌اند. سیگار با ۱۴/۷ درصد و مشروبات الكلی با ۹/۸ درصد شایع‌ترین مواد مورد مصرف در طول عمر در میان دانشآموزان بودند. میزان شیوع سایر مواد در

طول عمر ۲/۵ درصد بود. در همه موارد شیوع مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در پسرها بیشتر از دخترها بود. مهربانی و همکارانش در سال ۲۰۱۹ در یک مطالعه تحقیقی به بررسی شیوع و ارتباط مصرف الکل در طول زندگی در میان بزرگسالان ایرانی ساکن در مناطق شهری پرداختند. شرکت کنندگان از مراکز پنج استان-تهران، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان و خراسان‌رضوی در سال ۲۰۱۵ انتخاب شدند. این محققین پرسشنامه تحقیقی را در بین ۲۰۶۵ شرکت کننده (۴۴۰۶ درصد زنان و باقی مردان) توزیع نمودند. شیوع مصرف الکل در طول عمر ۲۸٪ بود. شیوع مصرف الکل در بین مردان بیشتر از زنان بود.

تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد که از ۸۰۶ ورزشکار شرکت کننده در این تحقیق، ۷۰۸ ورزشکار تاکنون هیچ ماده مخدر، روان‌گردان و یا مشروبات الکلی را مصرف نکرده و ۹۸ ورزشکار (۶۸ مرد ورزشکار و ۳۰ زن ورزشکار) مصرف این مواد را تجربه کرده بودند. با این حساب میزان شیوع مصرف مواد ممنوعه مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی در ورزشکاران استان تهران ۱۲/۱۵ درصد است که این شیوع در مردان ورزشکار ۱۶/۵۰ درصد و در زنان ورزشکار استان تهران ۷/۶۱ درصد است. به صورت تفکیک شده بر اساس تحلیل نتایج این تحقیق مشخص شد که شیوع مصرف سیگار ۹/۶۷ درصد (۱۱/۴۰ درصد در بین مردان ورزشکار و ۷/۸۶ درصد در بین زنان ورزشکار)، شیوع مصرف مواد مخدر ۲/۴۸۱ درصد (۳/۸۸۳ درصد در بین مردان ورزشکار و ۱/۰۱ درصد در بین زنان ورزشکار)، شیوع مصرف مواد روان‌گردان در ورزشکاران استان تهران ۱/۷۴ درصد (۲/۹۱ درصد در بین مردان ورزشکار، ۰/۵۰ درصد در بین زنان ورزشکار)، شیوع مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران ۱۱/۴۱ درصد (۱۵/۲۹ درصد در بین مردان ورزشکار و ۷/۳۶ درصد در بین زنان ورزشکار) بود. در این تحقیق مردان ورزشکار استان تهران تقریباً نزدیک به دو برابر زنان ورزشکار اقدام به مصرف مواد انواع مواد ممنوعه می‌نمایند و با وجود عواقب و مشکلات ناشی از مصرف این مواد در بین افراد مصرف کننده باز هم شاهد مصرف بالای این مواد توسط ورزشکاران استان تهران می‌باشیم. این نتایج نشان می‌دهد شیوع مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران قدری کمتر از نتایج مطالعاتی است که مصرف این

مواد را در جامعه عمومی گزارش داده‌اند. در ادامه چندین مطالعه در خارج از کشور را نیز توصیف می‌کنیم تا مشخص شود مصرف این مواد در کل در کشور ما با دیگر کشورها دارای چه تفاوتی است.

به عنوان اولین جمعیت مستعد مصرف این مواد، مطالعات زیادی مصرف این مواد را بر روی نوجوانان و جوانان دانش‌آموز مورد بررسی قرار داده‌اند. تحقیقات دیگری نیز به بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان‌گردن عمدتاً در نوجوانان و جوانان پرداخته‌اند. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند که ۱۴/۲٪^۱ از دانش‌آموزان دیرستانی از مواد روان‌گردن (پاولویک و جاکوولیک^۲؛ ۲۰۰۸؛ چووینک^۳، ۱۹۹۷)، ۵٪^۴ تا ۳۶٪^۵ از ماری جوانا (هنری، اشمیت و کولدویل^۶؛ ۲۰۰۷؛ پیترز^۷ و همکاران، ۲۰۰۵؛ هنری کیوز و دیکاروالو^۸؛ ۲۰۰۸؛ پاولویک و جاکوولیک^۹، ۲۰۰۸؛ پوسکار، برناردو، سویطلا و چوقتای^{۱۰}؛ واگنر، ریت-اولسون، سوتو و انگر^{۱۱}؛ ۲۰۰۸؛ چووینک، ۱۹۹۷)^{۱۲}٪ ۳۷/۲ تا ۸۰/۵٪ از الكل (جوهانستون، اومالی و بچمن^{۱۳}؛ ۲۰۰۱؛ هنری کیوز و دیکاروالو، ۲۰۰۸) دان، گودرو، گیوین و آستین^{۱۴}؛ ۲۰۰۸؛ ۵٪^{۱۵} تا ۴۷٪^{۱۶} از کانابیس (تی یو، راتنر و جوهانسون^{۱۷}؛ بروک، دان، ژانک، کوهن و بروک^{۱۸}؛ ۲۰۰۸)، ۶٪^{۱۹} تا ۴۲٪^{۲۰} از تنبیکو و یا سیگار (الگویان و همکاران، ۲۰۱۱؛ هنری کیوز و دیکاروالو، ۲۰۰۸؛ واگنر و همکاران، ۲۰۰۸؛ بروک و همکاران، ۲۰۰۸؛ دان و همکاران، ۲۰۰۸؛ گروتوت، استیگوم، هاونگم و گراف ایورسن^{۲۱}؛ ۲۰۰۸؛ پریماک، لند و فاین^{۲۲}؛ ۲۰۰۸؛ ۴٪^{۲۳} تا ۴/۹٪^{۲۴} از مواد استنشاقی (پاولویک و جاکوولیک^{۲۵}؛ ۲۰۰۸؛ چووینک، ۱۹۹۷)، ۱٪^{۲۶} از آمفاتامین (پاولویک و جاکوولیک، ۲۰۰۸؛ ۱۹٪^{۲۷} از حشیش (بواهری، ۱۳۸۱)، ۲/۴٪^{۲۸} تا ۳/۷٪^{۲۹} از کوکائین (پاولویک و جاکوولیک، ۲۰۰۸؛ عباسیوبونگ، آتنگ، باسی و ایکوت^{۳۰}،

1. Pavlovic & Jakovljevic
2. Schwenk
3. Henry, Smith & Caldwell
4. Peters
5. Henriquez & de Carvalho
6. Puskar, Bernardo, Switala & Chughtai
7. Wagner, Ritt-Olson, Soto & Unger
8. Johnston, O’Malley & Bachman
9. Dunn, Goodrow, Givens & Austin
10. Tu. Ratner & Johnson
11. Brook, Duan, Zhang, Cohen & Brook
12. Grotvedt, Stigum, Hovengen & Graff-Iversen
13. Primack, Land & Fine
14. Abasiubong, Atting, Bassey & Ekott

۲۰۰۸؛ پریماک و همکاران، ۲۰۰۸) و ۷٪ تا ۲/۳٪ از آن‌ها نیز از هروئین (پاولویک و جاکوویک، ۲۰۰۸؛ عباسیوبونگ و همکاران، ۲۰۰۸) استفاده کرده بودند.

صرف این نوع مواد در دانشآموزان ایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شیوع مواد مخدر و روان‌گردان در دانشآموزان دختر این تحقیق برابر با ۳/۹۱٪ و در دانشآموزان پسر عضو نمونه این تحقیق برابر با ۹/۱۶٪ بود. این میزان نسبت به مطالعات خارج از کشور دارای نرخ نسبتاً کمتری بود. اما آمارهایی هم در جمعیت عمومی وجود دارد. برطبق آخرین آمار و اطلاعات مرکز ملی اطلاعات و آمار سوء مصرف مواد در سال ۲۰۲۰ گزارش می‌نماید که ۵۰ درصد جوانان حادل یکبار از مواد ممنوعه در طول زندگی خویش استفاده کرده و ۴۳ درصد از ایشان در حال مصرف مواد ممنوعه و غیر قانونی هستند. براساس نتایج ارائه شده در این سایت میزان مصرف الكل ۶۱/۵٪، ماری جو آنا یا حشیش و بنگ ۴۵٪، مصرف داروهای ممنوعه دیگر ۱۹/۵٪، آفتامین ۹/۲ درصد، توهمزا ۱۱/۷ درصد، اکستازی ۴/۹ درصد و مواد استنشاقی نیز ۴/۹ در بین نوجوانان مصرف می‌شود.

نتایج حاصل شده در این تحقیق با نتایج بدست آمده در دیگر مطالعات خارج از کشور نیز نسبتاً متفاوت است و نشان از گزارش شیوع نسبتاً پائین‌تر این مواد در ورزشکاران استان تهران دارد. اما آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد مقایسه نتایج این تحقیق با شیوع‌های مصرف مواد گزارش شده در ورزشکاران دیگر کشورها است. با این مقایسه هم می‌توان نتایج این تحقیق را با مطالعات مشابه خارج از کشور مقایسه نمود و هم می‌خواهیم در خصوص نقش ورزش در کاهش مصرف این مواد بحث نماییم. مطالعاتی در داخل کشور وجود دارد که مصرف این مواد را در ورزشکاران ایرانی کمتر از همتایان غیر ورزشکارشان نشان داده است. به عنوان مثال حمیدیه، مطلبی، عاشری و بروجردی (۱۳۸۷) هم در یک مطالعه تحقیقی به بررسی شیوع مصرف مواد محرک، الكل و داروهای روان‌گردان در نوجوانان و جوانان ۱۵-۳۵ ساله شهر تهران پرداختند. این محققین در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۸۱۷۵ نوجوان و جوان را با یک پرسشنامه خودگزارش‌دهی بدون نام مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد شیوع مصرف این مواد در بین

ورزشکاران در خصوص داروهای روان گردن ۳ درصد در برابر $\frac{3}{8}$ درصد بود، در مواد محرک ۵ درصد در برابر $\frac{7}{2}$ درصد بود، در مصرف الكل ۲۵ درصد در برابر $\frac{25}{7}$ درصد بود و در مصرف سیگار نیز $\frac{12}{5}$ درصد در برابر $\frac{19}{8}$ درصد بود. این مطالعه به خوبی نقش ورزش (ورزش عادی و نه حر斐) را در کاهش مصرف مواد ممنوعه نشان داد. علاوه بر این تحقیق، در تحقیقات متعددی در خارج از کشور هم مصرف این مواد در ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفته است. مک داف^۱ و همکارانش در سال ۲۰۱۹ در یک مطالعه تحقیقی به بررسی شیوع مصرف، الگوهای مصرف، عوامل خطر، اثرات عملکردی و انواع مداخلات در تمام طبقات مواد تفریحی و تقویت کننده عملکرد در ورزشکاران نخ به بر اساس ورزش، قومیت، کشور و جنسیت پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد شیوع مصرف الكل، حشیش، تباکو (نیکوتین) و مواد مخدر و مواد مخدر تجویز شده بیشترین استفاده را در ورزشکاران نخ به دارد، اما به طور کلی با نرخ پایین تری نسبت به افراد غیر ورزشکار استفاده می شود. این نتایج نیز همخوان با مطالعه حاضر بوده و مصرف این مواد را در ورزشکاران کمتر از سایر همتایان غیر ورزشکارشان گزارش نموده اند. در کل می توان جمع بندی نمود مصرف این مواد در جمعیت عمومی در کشور ما در دامنه ای نسبتا مشابه با مطالعات خارج از کشور است. در خصوص مقایسه مصرف این مواد در ورزشکاران استان تهران با ورزشکاران خارج از کشور، هر جا مطالعات مصرف این مواد را در جمعیت ورزشکاران حر斐 گزارش کرده اند، مصرف مواد در ورزشکاران استان تهران نسبتا بیشتر است، اما در مقایسه با جمعیت های ورزشکار عمومی دارای نرخ نسبتا مشابه و حتی کمتری هستیم. اما بهتر است با مصرف این مواد در جمعیت ورزشکاران استان تهران به عنوان یک واقعیت گزارش شده برخورد کنیم. چنانچه به میزان نرخ شیوع مصرف این مواد در ورزشکاران استان تهران توجه کنیم خواهیم دید شیوع مصرف این مواد توسط $\frac{12}{158}$ درصد، عدد بسیار بالایی است و این عدد در مردان ورزشکار $\frac{16}{50}$ درصد و در زنان ورزشکار استان تهران $\frac{7}{61}$ درصد است که در هر دو

جمعیت می‌تواند یک هشدار بسیار بزرگ باشد و لزوم تدوین برنامه‌های پیشگیری را به خوبی نشان می‌دهد.

سن شروع سوء مصرف مواد مخدر، روان‌گردن و نوشیدنی‌های الکلی در ورزشکاران استان تهران: پژوهش‌ها نشان داده است که آسیب پذیرترین دوره در اکثر افراد، دوره‌های انتقال است (بریسلاؤو، میلر، چونگ، وی جی و شوئیتزر^۱، ۲۰۱۱). یعنی زمانی که آن‌ها از یک مرحله رشدی به مرحله دیگر می‌روند. اولین انتقال رشد کودک زمانی است که او محیط امن خانه را ترک می‌کند و به مدرسه گام می‌گذارد. گذر از دوره‌ی ابتدایی به راهنمایی و اوایل دبیرستان کودک را با چالش‌ها و مسائل اجتماعی متعددی رویه‌رو می‌کند؛ برای مثال کنار آمدن و ارتباط با گروه هم سال. در واقع، در این مرحله، یعنی نوجوانی است که کودک ممکن است برای اولین بار با مواد مخدر مواجه شود و در دوره‌ی دبیرستان نیز هم زمان با آماده شدن نوجوان برای آینده خطر رویه‌رو شدن با این مواد بیشتر می‌شود. در ادامه، در دوران جوانی با ورود بیشتر به جامعه این خطرها افزایش یافته و امکان سوء مصرف مواد بیشتر می‌شود (طارمیان، ۱۳۸۱). نتایج تحقیقات انجام شده در کشور نشان داده است که توجه به راهبردهای فرهنگی در قیاس با سایر راهبردها، با تاثیرگذاری بر نگرش جامعه هدف نقش مهمی را در محدودسازی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ایفا می‌نماید (ممیز، گلشنی و طالیان، ۱۴۰۰). همچنین بر اساس نتایج یک مطالعه جدید دیگر در کشورمان، می‌توان آموزش خودشفابخشی را به عنوان یکی از رویکردهای جدید مثبت نگرجهت افزایش سلامت روان شناختی افراد وابسته به مواد مخدر با اثرات نسبتاً پایدار برای افزایش مهارت‌های خود مراقبتی به کاربرد (ایرانی، لطیفی و سلطانی‌زاده، ۱۴۰۰). لذا توجه به این دسته موضوعات می‌تواند برای پیشگیری از مصرف این مواد و همچنین درمان افراد درگیر در این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که میانگین سن شروع مصرف سیگار بین ۱۱-۱۲ سالگی (کورهونن^۲ و همکاران، ۲۰۰۸؛ یانگ، لانگ استاف و تنن‌بین^۳، ۱۹۹۹) بوده و

1. Breslau, Miller, Chung, W.-J. & Schweitzer

2. Korhonen
3. Young, Longstaffe & Tenenbein

صرف اکثر مواد ممنوعه مخدر و روان‌گردن در نوجوانی شروع می‌شود (دی آمیکو و مک کاردن^۱، ۲۰۰۶؛ تی یو و همکاران^۲، ۲۰۰۸؛ یانگ و همکاران^۳، ۱۹۹۹؛ نوینز و بارونز^۴، ۲۰۰۴). البته تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که صرف این مواد (یا زمان اوچ صرف را) را در پایان نوجوانی و ابتدای جوانی می‌توان مشاهده نمود (نوینز و بارونز، ۲۰۰۴؛ بریچ، گرینویل و آنجلین^۵، ۲۰۰۷؛ مکس ویل^۶، ۲۰۰۸). توجه به این نتایج نشان می‌دهد که مرز دقیقی را نمی‌توان به عنوان سن شروع صرف در نظر گرفت چراکه عوامل متعددی در شروع صرف این مواد در بین جوانان و نوجوانان در هر جامعه و با هر فرهنگی وجود دارد. لذا می‌بایست جانب احتیاط را رعایت نموده و حداکثر در اوایل سینین نوجوانی برنامه‌های پیشگیری لازم را تدوین و در سراسر دوره نوجوانی و جوانی این برنامه‌ها را اجرا نمود و هشدارها و مراقبت‌های لازم را اعمال نمود، که البته این خود نیازمند تحقیقات بیشتر بر روی این گروه سنی و شناخت عوامل گرایش آنها می‌باشد. زیرا پژوهشگران معتقد‌اند که نوجوانان از صرف مواد غیر مجاز قانونی در سینین پائین‌تر (نظیر سیگار، مشروبات الکل و مواد استنشاقی) به صرف مواد غیر قانونی در سینین بالاتر (معمولًا ماری جوانا، حشیش، مواد مخدر و روان‌گردن) روی می‌آورند (طارمیان، ۱۳۸۱). بر اساس گزارش نتایج این تحقیق می‌توان بیان داشت احتمالاً حضور افراد ورزشکار در جامعه و ایجاد یک فضای فعالیت خارج از منزل برای نوجوانان و جوانان شاید این فرصت را برای ایشان ایجاد نماید که زودتر از همتایان خویش با این مواد آشنا شده و اقدام به صرف این مواد نمایند. لذا لازم است این قشر از جامعه بیشتر و در سینین پائین‌تر مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های پیشگیری را دریافت نمایند.

تشکر و قدردانی

این پژوهش به سفارش و با کمک مالی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شده است. لذا از این سازمان و بالاخص همکاران بخش پژوهش تشکر و قدردانی می‌شود.

1. D'Amico & McCarthy
2. Novins & Baron

3. Brecht, Greenwell L; Anglin
4. Maxwell

منابع

- اشرفی حافظ، اصغر؛ فکور زیبا، محمد رضا؛ قبادی داشدبی، کامل؛ حسینی، فاطمه؛ رزم پوش، فاطمه؛ قارلی پور، ذبیح‌الله؛ بابایی حیدر آبادی، اکبر و ولی زاده، رضا (۱۳۹۲). بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف مواد روان‌گردان در دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۱، ۶۶-۵۸.
- ایرانی، زهرا؛ لطیفی، زهره و سلطانی‌زاده، محمد (۱۴۰۰). اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کد‌های شفابخش) بر حس انسجام در مردان وابسته به مواد مخدرا. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۵(۶۱)، ۲۶۱-۲۸۲.
- بوالهربی، جعفر (۱۳۸۱). ارزیابی سوء مصرف مواد مخدرا در زندان‌های ایران. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱(۳)، ۵۰-۱۳.
- حمدیه، مصطفی؛ مطلبی، نبی؛ عاشری، حسین و بروجردی، اشرف (۱۳۸۷). بررسی شیوع مصرف مواد محرك، الكل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان ۱۵-۳۵ ساله شهر تهران. پژوهش در پزشکی، ۳۲(۴)، ۳۱۹-۳۱۵.
- شیخ، محمود و کاشی، علی (۱۳۹۲). سوء مصرف مواد در دانش آموزان ایرانی. طرح پژوهشی به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری.
- طارمیان، فرهاد (۱۳۸۱). بحث ویژه: پیشگیری از سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان (راهنمای متکی بر پژوهش). فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۶(۲)، ۱۵۵-۱۴۳.
- قویدل، نوشین؛ صمدی، مریم؛ خرم‌نیز، امیرحسین؛ اسدی، علی؛ فیضی، علیرضا؛ احمدی، رفیه؛ عابدینی، مجتبی و حسینی، فاطمه (۱۳۹۱). بررسی شیوع مصرف مواد (سیگار، مواد مخدرا، الكل، مواد روان‌گردان) و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان سوم دبیرستان شهرستان نظر آباد. مجله علوم پزشکی رازی، ۹(۹۷)، ۳۶-۲۸.
- کاشی، علی و سرلک، زهرا (۱۳۸۵). شیوع مصرف مواد نیروزا، مخدرا و روان‌گردان در جوانان و نوجوانان استان لرستان و عوامل مؤثر بر آن. طرح تحقیقاتی به سفارش پلیس مبارزه با مواد مخدرا کشور.
- کاشی، علی و سرلک زهرا (۱۳۹۹). پیمايش ملی مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی. طرح تحقیقاتی به سفارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان (مجری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی).

۱۰۸
108

سال پانزدهم شماره ۶۲، زمستان ۱۴۰۰
Vol. 15, No. 62, Winter 2022

کاشی، علی؛ نقیبی، سعید؛ شریعت زاده، محمد و آقابابا، علیرضا (۱۳۹۶). مرور نظام مند و فرا تحلیل پژوهش‌های انجام شده در حوزه شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی. *نشریه فیزیولوژی ورزشی*، ۹(۶)، ۳۸-۴۷.

کاشی، علی؛ کارگرفرد، مهدی؛ مولوی، حسین و سرلک، زهرا (۱۳۸۴). مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران رشتہ‌ی بدن‌سازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه‌های جانبی. *المپیک*، ۲(۳۴)، ۷۳-۸۵.

کاشی، علی و سرلک، زهرا (۱۳۸۶). شیوع مصرف مواد نیروزا در دانش آموزان استان لرستان. طرح تحقیقی به سفارش پژوهشکده تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان. محمد خانی، شهرام (۱۳۹۰). شیوع مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد روان‌گردن در نوجوانان ایرانی. *مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان*، ۱۹(۱)، ۴۸-۳۲.

ممیز، احمد رضا؛ گلشنی، علیرضا و طالبیان، محمّحسن (۱۴۰۰). نقش سیاست گذاری آموزشی در تغییر آگاهی و نگرش (در ک خط) نوجوانان و جوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر. *فصلنامه علمی اعتیاد‌پژوهی*، ۱۵(۶۱)، ۱۴۴-۱۱۹.

References

- Abasiubong, F., Atting, I., Bassey, E., & Ekott, J. (2008). A comparative study of use of psychoactive substances amongst secondary school students in two local Government Areas of Akwa Ibom State, Nigeria. *Nigerian journal of clinical practice*, 11(1), 45-52.
- Ahmadi, J., Naghshvarian, M., & Afshari, R. (2011). Opioids use in male population referred for mandatory urine opioid screen before marriage in shiraz-iran. *Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences*, 5(2), 126-130.
- Al Ghobain, M. O., Al Moamary, M. S., Al Shehri, S. N., & Al-Hajjaj, M. S. (2011). Prevalence and characteristics of cigarette smoking among 16 to 18 years old boys and girls in Saudi Arabia. *Annals of thoracic medicine*, 6(3), 137-140.
- Brech, M. L., Greenwell, L., & Anglin, M. D. (2007). Substance use pathways to methamphetamine use among treated users. *Addictive behaviors*, 32(1), 24-38.
- Breslau, J., Miller, E., Chung, W. J. J., & Schweitzer, J. B. (2011). Childhood and adolescent onset psychiatric disorders, substance use, and failure to graduate high school on time. *Journal of psychiatric research*, 45(3), 295-301.

- Brook, J. S., Duan, T., Zhang, C., Cohen, P. R., & Brook, D. W. (2008). The association between attention deficit hyperactivity disorder in adolescence and smoking in adulthood. *American journal on addictions*, 17(1), 54-59.
- D'Amico, E. J., & McCarthy, D. M. (2006). Escalation and initiation of younger adolescents' substance use: The impact of perceived peer use. *Journal of adolescent health*, 39(4), 481-487.
- Docter, S., Khan, M., Gohal, C., Ravi, B., Bhandari, M., Gandhi, R., & Leroux, T. (2020). Cannabis use and sport: a systematic review. *Sports health*, 12(2), 189-199.
- Dunn, M. S., Goodrow, B., Givens, C., & Austin, S. (2008). Substance use behavior and suicide indicators among rural middle school students. *Journal of school health*, 78(1), 26-31.
- Exner, J., Bitar, R., Berg, X., Pichler, E. M., Herdener, M., Seifritz, E., & Claussen, M. C. (2021). Use of psychotropic substances among elite athletes—a narrative review. *Swiss medical weekly*, 151, 1-6.
- Grotvedt, L., Stigum, H., Hovengen, R., & Graff-Iversen, S. (2008). Social differences in smoking and snuff use among Norwegian adolescents: a population based survey. *BMC public health*, 8(1), 1-12.
- Henriquéz, P. C., & Carvalho, A. M. P. D. (2008). Perceptions of drugs benefits and barriers to quit by undergraduate health students. *Revista latino-americana de enfermagem*, 16(SPE), 621-626.
- Henry, K. L., Smith, E. A., & Caldwell, L. L. (2007). Deterioration of academic achievement and marijuana use onset among rural adolescents. *Health education research*, 22(3), 372-384.
- Heydari, S. T., Vossoughi, M., Akbarzadeh, A., Lankarani, K. B., Sarikhani, Y., Javanmardi, K., & Tabrizi, R. (2016). Prevalence and risk factors of alcohol and substance abuse among motorcycle drivers in Fars province, Iran. *Chinese journal of traumatology*, 19(2), 79-84.
- Johnston, L., O'Malley, P. M., & Bachman, J. G. (2001). *Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2000: Secondary school students* (Vol. 1). United State: National Institute on Drug Abuse, US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.
- Kanayama, G., Pope Jr, H. G., Cohane, G., & Hudson, J. I. (2003). Risk factors for anabolic-androgenic steroid use among weightlifters: a case-control study. *Drug and alcohol dependence*, 71(1), 77-86.
- Korhonen, T., Huizink, A. C., Dick, D. M., Pulkkinen, L., Rose, R. J., & Kaprio, J. (2008). Role of individual, peer and family factors in the use of cannabis and other illicit drugs: a longitudinal analysis among Finnish adolescent twins. *Drug and alcohol dependence*, 97(1-2), 33-43.
- Lipari, R. N., & Van Horn, S. L. (2017). Trends in substance use disorders among adults aged 18 or older. *The CBHSQ Report*, 1-10.

- Maxwell, J. C. (2008). Are we becoming more alike? Comparison of substance use in Australia and the United States as seen in the 1995, 1998, 2001 and 2004 national household surveys. *Drug and alcohol review*, 27(5), 473-481.
- McDuff, D., Stull, T., Castaldelli-Maia, J. M., Hitchcock, M. E., Hainline, B., & Reardon, C. L. (2019). Recreational and ergogenic substance use and substance use disorders in elite athletes: a narrative review. *British journal of sports medicine*, 53(12), 754-760.
- Mehrabi, M., Hajebi, A., Mohebbi, E., Baneshi, M. R., Khodadost, M., Haghdoost, A. A., & Noroozi, A. (2019). Prevalence and correlates of lifetime alcohol use among adult urban populations in Iran: A knowledge, attitude, and practice study. *Journal of psychoactive drugs*, 51(3), 290-297.
- Merline, A. C., O'Malley, P. M., Schulenberg, J. E., Bachman, J. G., & Johnston, L. D. (2004). Substance use among adults 35 years of age: prevalence, adulthood predictors, and impact of adolescent substance use. *American Journal of Public Health*, 94(1), 96-102.
- Moran, A., Guerin, S., Kirby, K., & MacIntyre, T. (2008). *The development and validation of a doping attitudes and behaviour scale*. Northern Ireland: World Anti-Doping Agency & The Irish Sports Council.
- Nahvizadeh, M. M., Akhavan, S., Arti, S., Qaraat, L., Geramian, N., Farajzadegan, Z., & Heidari, K. (2014). A review study of substance abuse status in high school students, Isfahan, Iran. *International journal of preventive medicine*, 5(2), 77-82.
- National Institute of Drug Abuse and addiction (NIDA). (2020). *Drug Use Among Youth: Facts & Statistics*. <https://drugabusestatistics.org/teen-drug-use/>
- Nilsson, S., Baigi, A., Marklund, B., & Fridlund, B. (2001). The prevalence of the use of androgenic anabolic steroids by adolescents in a county of Sweden. *The European journal of public health*, 11(2), 195-197.
- Novins, D. K., & Barón, A. E. (2004). American Indian substance use: The hazards for substance use initiation and progression for adolescents aged 14 to 20 years. *Journal of the american academy of child & adolescent psychiatry*, 43(3), 316-324.
- Pavlović, Z., & Jakovljević, B. (2008). Frequency and risk factors of the use of psychoactive substances among the young. *Vojnosanitetski pregled*, 65(6), 441-448.
- Peters Jr, R. J., Kelder, S. H., Meshack, A., Yacoubian Jr, G. S., McCrimmon, D., & Ellis, A. (2005). Pilot Study, Beliefs and Social Norms about Cigarettes or Marijuana Sticks Laced with Embalming Fluid and Phencyclidine (PCP): Why Youth Use "Fry". *Substance use & misuse*, 40(4), 563-571.

- Primack, B. A., Land, S. R., & Fine, M. J. (2008). Adolescent smoking and volume of exposure to various forms of media. *Public health*, 122(4), 379-389.
- Puskar, K. R., Bernardo, L. M., Switala, J., & Chughtai, R. L. (2008). Adolescent substance use in rural America: Current profile. *Journal of addictions nursing*, 19(3), 150-155.
- Randall, R. W., Grage, M., & Rodrigo, A. (2002). Anabolic steroids and pre adolescent athletic: Prevalence, knowledge and attitude. *The sport journal*, 5, 1-11.
- Schwenk, T. L. (1997). Psychoactive drugs and athletic performance. *The physician and sportsmedicine*, 25(1), 32-46.
- Tu, A. W., Ratner, P. A., & Johnson, J. L. (2008). Gender differences in the correlates of adolescents' cannabis use. *Substance use & misuse*, 43(10), 1438-1463.
- United Nations Office on Drugs and Crime (2020). *Global drug use rising; while COVID-19 has far reaching impact on global drug markets*. <https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2020/June/media-advisory--global-launch-of-the-2020-world-drug-report.html>
- Wagner, K. D., Ritt-Olson, A., Soto, D. W., & Unger, J. B. (2008). Variation in family structure among urban adolescents and its effects on drug use. *Substance use & misuse*, 43(7), 936-951.
- Worldometers (2018). <https://www.worldometers.info/>
- Young, S. J., Longstaffe, S., & Tenenbein, M. (1999). Inhalant abuse and the abuse of other drugs. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 25(2), 371-375.

۱۱۲
۱۱۲

۱۴۰۰، زمستان
سال پانزدهم شماره ۵۶
Vol. 15, No. 62, Winter 2022